

# Έντυπο καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλυμπος 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

01

ΚΑΛΑΓΧΟΗ

## Βοτανική ονομασία

Kalanchoe spp.

**Προέλευση** Κίνα, τροπική  
Ασία, Αφρική και Ν. Αμερική

**Δυσκολία καλλιέργειας**  
Χαμηλή

Η καλαγχόη είναι μία χυμώδης κρassoυλίδα, συγκεντρώνει δηλαδή νερό στα φύλλα. Δεν είναι πολύ ψηλό φυτό, έχει φύλλα ευχάριστα στην αφή, σαρκώδη και εξογκωμένα, με οδοντωτά ή λεία άκρα. Το χρώμα τους είναι λαμπερό πράσινο-γκρι με κοκκινωπές αποχρώσεις προς τα άκρα. Τα άνθη είναι συγκεντρωμένα σε ακραίους θυσάνους, εντυπωσιακούς και διακοσμητικούς, με έντονα χρώματα: κίτρινο, λευκό, ροζ, σομόν, ακνό πορτοκαλί, κόκκινο ή πορφυρό, ακόμα και σε διάφορες αποχρώσεις.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Η φροντίδα της καλαγχόης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και είναι φυτό με μεγάλη διάρκεια. Μην την ποτίζετε πολύ το χειμώνα (το πολύ ένα ποτήρι νερό την εβδομάδα για κάθε γλάστρα) και αποφεύγετε τη στασιμότητα νερού στο πιάτο της γλάστρας.

Η ανθοφορία γίνεται το χειμώνα. Μετά την ανθοφορία πρέπει να αφαιρέσετε τα ξερά άνθη με όλο το κοτσάνι. Αυτό επιτρέπει στο φυτό, στη μασαλιαία περιοχή των φύλλων, να βγάλει νέα μπουμπούκια και νέα άνθη. Αφαιρείτε τα ξερά φύλλα όπου υπάρχουν.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Κιτρινασμένα φύλλα και ξερά κατά μέρη, παρουσία αποικιών ασιπιδίων που αφήνουν μία κολλώδη σακχαρώδη ουσία: ψώρα. Αφαιρείται με το χέρι, με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη ή με θεραπείες με βάση το ορυκτέλαιο.

Σήψη των ριζών και του λαιμού: υπερβολικό πόσιμο ή ανεπαρκής αποστράγγιση του εδάφους ή του δοχείου. Το πρόβλημα εξαλείφεται αν προσέξετε τις απαιτήσεις καλλιέργειας, διαπρύνοντας πάντοτε τη σωστή αποστράγγιση του χώματος, χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο χώμα και αφαιρώντας τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα. Σε περίπτωση ενεργούς προσβολής, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο κατάλληλο για την επεξεργασία του εδάφους.

Παρουσία φλυκταινών χρώματος σκούρου πορτοκαλί: σκωρίαση της καλαγχόης (μυκητολογική ασθένεια). Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό μυκητοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Πλούσια και πολύχρωμη άνθιση το χειμώνα



#### Έκθεση

Σε φωτεινό χώρο, αλλά όχι με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως



#### Λίπασμα

Μία φορά το μήνα περίπου με λίπασμα για μεγάλα φυτά



#### Θερμοκρασία

Γύρω στους 20°C



#### Ανθοφορία

Παράγει πολλά άνθη, έχει κύκλους ανθοφορίας από το Νοέμβριο ως τον Απρίλιο



#### Νερό

Ποτίστε μόνο αν το χώμα είναι εντελώς στεγνό. Δεν αντέχει το στάσιμο νερό στο πιάτο της γλάστρας και το απευθείας βρέξιμο των φύλλων



#### Πολλαπλασιασμός

Με μόσχευμα ή με σπόρο



#### Χώμα

Μίγμα άμμου και χώματος σε ίσα μέρη

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Ανθοφόρα εσωτ. χώρου 02 ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ

### Βοτανική ονομασία

Saintpaulia spp.

### Προέλευση

Τροπική και Νότια Αφρική

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Πρόκειται για ένα αειθαλές και πολυετές φυτό με φύλλα που ξεκινούν απευθείας από τη ρίζα, σε σχήμα καρδιάς, με ενιαίο περίγραμμα, τα οποία δημιουργούν αρκετά βαθιά νεύρα.

Τα φύλλα καλύπτονται από συμπαγές χνούδι και στην επάνω όψη φέρουν ραβδώσεις σκούρου πράσινου και λευκού χρώματος, ενώ αντίθετα, στην κάτω όψη, μοβ αποχρώσεις. Τα άνθη έχουν χρώμα σκούρο μοβ, μελιτζανί, ροζ ή λευκό και κατανέμονται σε μικρές συστάδες

### Οι συμβουλές Leroy Merlin

#### Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε χώρο όπου να μην είναι εκτεθειμένο σε ρεύματα αέρα, σε φωτεινή θέση, όχι όμως με άμεση έκθεση στον ήλιο.

Είναι πολύ ευαίσθητο στο υπερβολικό νερό. Όταν το ποτίζετε, προσέξτε να μην βρέχετε τα φύλλα, τους μίσχους και τα άνθη. Ποτίζτέ το στη βάση: γεμίστε ένα πιστάκι με νερό και αφήστε το φυτό να απορροφήσει το νερό από τις ρίζες.

Αφαιρέστε τα ξερά άνθη, για να ενεργοποιήσετε την παραγωγή νέων βλαστών. Με βρεγμένο πινέλο, αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη, που εναποτίθεται στα φύλλα και τους μίσχους.

Αν καταφέρετε να βρείτε τη σωστή θέση και γνωρίζετε τη σωστή δόση ποτίσματος, θα μπορέσετε να απολαύσετε την ανθοφορία των αφρικανικών βιολετών για πολλά χρόνια, πολλαπλασιάζοντάς τις σε μεγάλο αριθμό γλαστρών.

#### Ασθένειες και συμπτώματα

Σήψη της βάσης που επηρεάζει το λαιμό και τις ρίζες: σήψη του λαιμού, λόγω φυτοφθόρας (μυκητολογική ασθένεια). Εξαλείψτε τα φυτά ή τα μέρη του φυτού που παρουσιάζουν συμπτώματα, μειώστε το πότισμα, διατηρείτε καλή αποστράγγιση στο χώμα και, σε περίπτωση μεταφύτευσης, βεβαιωθείτε ότι το χώμα είναι υγιές, διαφορετικά αποστειρώστε το με κατάλληλα μυκητοκτόνα για αυτό τον τύπο χρήσης. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας, ακολουθήστε θεραπεία στο χώμα με ειδικό μυκητοκτόνο.

Μαραμένες κορυφές, παρουσία αποικιών μικρών εντόμων, καχεκτικά φύλλα ή ξερά άκρα: μελίγκρα. Αντιμετωπίστε τα με ειδικό εντομοκτόνο και αποφύγετε, για να προλάβετε την εμφάνιση, την υπερβολική λίπανση.

### Χαρίζει μεγάλη ικανοποίηση ακόμα και σε όποιον δεν γνωρίζει πολλά για τα φυτά



#### Έκθεση

Σε χώρο πολύ φωτεινό, αλλά χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο μπορεί να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο



#### Θερμοκρασία

Όχι μικρότερη από 15°C, καλή ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες



#### Νερό

Ποτίζετε με φειδώ, στη βάση του φυτού. Αφήνετε να στεγνώσει το χώμα από το ένα πότισμα στο άλλο



#### Χώμα

Χώμα γενικής χρήσης για ανθοφόρα φυτά



#### Λίπασμα

Την περίοδο από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο πρέπει να προσθέτετε, κάθε 10-15 ημέρες, διαλυμένο υγρό λίπασμα



#### Ανθοφορία

6 μήνες μετά τη σπορά. Μερικές φορές, μία περίοδος ξηρασίας επανενεργοποιεί την ανθοφορία



#### Πολλαπλασιασμός

Με φυλλάδες μόσχευμα την άνοιξη. Ο πολλαπλασιασμός της είναι πολύ εύκολος

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



## Ανθοφόρα εσωτ. χώρου 03 Γ ΚΟΥΣΜΑΝΙΑ

### Βοτανική ονομασία

Guzmania spp.

### Προέλευση

Κεντρική και Νότια Αμερική

### Δυσκολία καλλιέργειας

Μέτρια-χαμηλή

Γένος που περιλαμβάνει πάνω από 100 είδη κατάλληλα για καλλιέργεια εντός του σπιτιού. Τα χαρακτηριστικά αυτού του φυτού είναι το λαμπερό χρώμα των σεπάλων, τα μεταμορφωμένα φύλλα σε αποχρώσεις από κόκκινο μέχρι πορτοκαλί, λιγότερο ή περισσότερο έντονες. Τα σέπαλα συνιστούν τον κεντρικό κάλυκα, γύρω από τον οποίο διατάσσονται τα φύλλα, με την επιμήκη μορφή και τη διάταξη τους σε ροζέττα, και μοιόμορφο πράσινο χρώμα ή με καφετί ή ενίοτε λευκές ραβδώσεις.

### Οι συμβουλές Leroy Merlin

#### Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε φωτεινά σημεία, χωρίς όμως να το εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως, το οποίο μπορεί να του κάψει τα φύλλα.

Μην ξεχνάτε να το προστατεύετε από πολύ υγρά περιβάλλοντα, τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν επιμήκυνση των φύλλων.

Ποτίστε άφθονα το καλοκαίρι, ενώ περιορίστε το πότισμα το χειμώνα, προσέχοντας να μην το βρέχετε με πολύ κρύο νερό, το οποίο μπορεί να κάψει τα φύλλα.

Κάνετε μεταφύτευση την άνοιξη, χρησιμοποιώντας γλάστρα λίγο μεγαλύτερη από την προηγούμενη.

#### Ασθένειες και συμπτώματα

Σήψη των φύλλων από την περιοχή της ροζέττας: φουζαρίωση (μυκητολογική ασθένεια). Η καταπολέμηση είναι σχεδόν αποκλειστικά προληπτική, καθώς είναι δύσκολο να θεραπευτούν τα προσβεβλημένα φυτά. Φυτέψτε τα χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο χώμα, αποφύγετε την υπερβολική υγρασία και, προληπτικά, επεξεργαστείτε το χώμα με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο.

Ζημιές του ριζικού συστήματος: μελίγκρα των ριζών. Εξαλείφονται διαπρύντας υγρό το χώμα ή χρησιμοποιώντας ειδικά εντομοκτόνα.

Καφετί κηλίδες στα φύλλα: κηλίδωση των φύλλων (μυκητολογική ασθένεια). Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Κιτρινασμένα φύλλα και ξερά κατά μέρη, παρουσία αποικιών ασπίδων που αφήνουν μία κολλώδη ουσία: ψώρα. Εξαλείφεται με το χέρι ή με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη. Σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, ακολουθήστε θεραπεία με ορυκτέλαιο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Ιδιαίτερα καλλωπιστικό χάρη στη λάμψη και την ένταση του χρώματος των φύλλων



#### Έκθεση

Επιλέξτε φωτεινές περιοχές, χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως



#### Λίπασμα

Την άνοιξη και το καλοκαίρι, κάθε 15 μέρες, προσθέτετε στο νερό του ποτίσματος ένα λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο



#### Θερμοκρασία

Ελάχιστη 18°C, μέγιστη 28°C



#### Ανθοφορία

Το καλοκαίρι



#### Νερό

Ποτίστε άφθονα την πιο θερμή εποχή, μειώστε στο ελάχιστο το χειμώνα



#### Πολλαπλασιασμός

Με παραβλαστήματα της βάσης και με σπόρο



#### Χώμα

Χώμα αναμειγμένο με φύλλα και χονδρόκοκκη τύρφη

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 &amp; Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

04

## ΣΠΑΘΙΦΥΛΛΟ

**Βοτανική ονομασία**

Spathyphillum spp.

**Προέλευση**

Νότια Αμερική, Μαλαισία

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Μέτρια - χαμηλή

Τροπικό φυτό, πολύ καλλωπιστικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από μακριά φύλλα, που φτάνουν ακόμα και τα 30 cm, λεία και με ζωηρό κίτρινο χρώμα, με κυματιστά άκρα και εμφανή νεύρα. Τα πραγματικά άνθη, τα οποία είναι μικρά, στρογγυλού σχήματος και υπόλευκου χρώματος, ενώνονται σε μία ταξιανθία (σπάδιξ) η οποία περιβάλλεται από ένα μεγάλο λευκό σέπαλο και αυτό το τελευταίο συνήθως αποκαλείται «άνθος».

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

**Καλλιέργεια**

Το καλοκαίρι βάλτε το φυτό σε σκιερή θέση αποφεύγοντας την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, το οποίο μπορεί να του κάψει τα φύλλα. Αντίθετα, το χειμώνα βάλτε το σε φωτεινή θέση.

Ποτίζετε άφθονα, προσέχοντας το χώμα να έχει καλή αποστράγγιση και ψεκάζετε τακτικά τα φύλλα. Για να διατηρείτε καλύτερα την υγρασία, μπορείτε επίσης να βάλετε αραιή λάσπη στο πιάτο της γλάστρας.

Μεταφυτέψτε το όταν οι ρίζες γεμίσουν όλο το διαθέσιμο χώρο της γλάστρας.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Κίτρινα άκρα στο φύλλωμα: ακάρεα. Εξαλείφονται με ειδικά ακαρεοκτόνα, πλένοντας όλο το φυτό και διατηρώντας την υγρασία σε υψηλά επίπεδα.

Παρουσία αποικιών ασιπιδίων στα φύλλα και τα κοτσάνια του φυτού: ψώρα. Θεραπεύεται με ένα πανί ή με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε αλκοόλη. Σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, αντιμετωπίστε με ορυκτέλαιο ενεργοποιημένο με ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Παραμόρφωση και κατασάρωμα των βλαστών, παρουσία αποικίας μικρών εντόμων: μελίγκρα. Εξαλείφονται χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Παρουσία σήψης στη βάση του φυτού και στις ρίζες: σήψη της βάσης του σπαθιφύλλου

(μυκητολογική ασθένεια). Αφαιρέστε τα φυτά ή τα μέρη του φυτού που παρουσιάζουν συμπτώματα, απολυμνάνετε σωστά το χώμα πριν από την τοποθέτηση, αποφύγετε τη στασιμότητα νερού και χρησιμοποιήστε υπόστρωμα με κατάλληλο pH (κοντά στο ουδέτερο). Οι χημικές θεραπείες δεν εγγυώνται την αποκατάσταση των άρρωστων φυτών.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Πολύ καλλωπιστικό με όμορφα λαμπερά φύλλα και κομψά λευκά άνθη****Έκθεση**

Το καλοκαίρι πρέπει να τοποθετείται σε σκιερή θέση, ενώ το χειμώνα σε φωτεινή

**Λίπασμα**

Τους πιο ζεστούς μήνες, προσθέστε μικρές αλλά συχνές δόσεις λιπάσματος

**Θερμοκρασία**

Αντέχει ικανοποιητικά στις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται όμως θερμοκρασία από 20°C ως 27°C

**Ανθοφορία**

Η ταξιανθία εμφανίζεται από το Μάρτιο ως το Σεπτέμβριο και έχει λευκό χρώμα

**Νερό**

Ποτίζετε με φειδώ το καλοκαίρι, μειώστε το πότισμα το χειμώνα

**Πολλαπλασιασμός**

Με διαίρεση των στελεχών. Μόλις γίνει η διαίρεση, το χώμα πρέπει να διατηρείται βρεγμένο για να ευνοηθεί η ανάπτυξη ριζών

**Χώμα**

Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους χώματος

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 &amp; Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

05

## ΑΝΘΟΥΡΙΟ

**Βοτανική ονομασία**

Anthurium spp.

**Προέλευση**

Κεντρική και Νότια Αμερική

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Μέτρια

Αειθαλές φυτό, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει σε ύψος το ένα μέτρο, με εντυπωσιακά άνθη σε έντονο χρώμα, από λευκό ως τις διάφορες αποχρώσεις του ροζ και του κόκκινου.

Το άνθος αποτελείται από ένα χρωματιστό φύλλο (σέπαλο) και από ένα μακρύ άνθος με ταξιανθία (σπάδιξ).

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

**Καλλιέργεια**

Τοποθετήστε το φυτό σε φωτεινούς χώρους, όχι όμως στον ήλιο, μακριά από πηγές θερμότητας και από ρεύματα αέρα.

Μην ξεχνάτε ότι απαιτεί θερμοκρασίες μέτριες και σταθερές, ακόμη και αν, για να ευνοηθεί ο σχηματισμός μπουμπουκιών, πρέπει να υποβληθεί στην αποκαλούμενη «κρύα» περίοδο, με άλλα λόγια σε περίπου πέντε εβδομάδες ελάχιστης νυχτερινής θερμοκρασίας γύρω στους 12°C.

Αφαιρείτε τα ξηρά και προσβεβλημένα μέρη. Πραγματοποιήστε τη μεταφύτευση στην αρχή της άνοιξης, επιλέγοντας χώμα εξαιρετικά πορώδες από χονδρόκοκκη τύρφη αναμεμιγμένη με πευκοβελόνες.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Σήψη των ριζών και του λαιμού: πλεόνασμα νερού. Εξαλείφεται με καλή αποστράγγιση και με συνεχές, αλλά όχι υπερβολικό πότισμα. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο εδάφους.

Κηλίδες στα φύλλα και στο φύλλο του άνθους: σепτορίωση (μυκητολογική ασθένεια). Καταπολεμάται με μυκητοκτόνα με βάση το χαλκό, διατηρώντας το φυτό στο ιδανικό περιβάλλον καλλιέργειας.

Ζημιές στις ρίζες και με ελλιπή ανάπτυξη, ύπαρξη κόμπων στις ρίζες: νηματώδεις σκώληκες (οργανισμοί που ζουν στο χώμα). Αλλάξτε το χώμα και αν η προσβολή συνεχιστεί, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό προϊόν κατά των νηματωδών.

Παρουσία αποικιών μικρών εντόμων στα υποκοτύλια και στα φύλλα: μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Ζημιές στα φύλλα και στα φύλλα των ανθέων κατόπιν παρουσίας γυμνοσαλιγκών (σαλιγκαριών χωρίς κέλυφος). Καταπολεμήστε τους, καθαρίζοντας το φυτό με το χέρι ή χρησιμοποιώντας ειδικά δολώματα για τα σαλιγκάρια.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Φυτό με υπέροχα άνθη σε σχήμα καρδιάς, που αποκαλούνται «βέλη του έρωτα» και χαρίζονται του Αγίου Βαλεντίνου**
**Έκθεση**

Τοποθετείται σε φωτεινό περιβάλλον, αλλά χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο

**Θερμοκρασία**

Ιδανική θερμοκρασία καλλιέργειας γύρω στους 20°C. Σε μικρότερη θερμοκρασία, παρουσιάζει μικρή ανάπτυξη και ανθοφορία

**Νερό**

Γενναϊόδωρο πότισμα το καλοκαίρι, τις άλλες περιόδους του χρόνου διατηρείτε υγρό το υπόστρωμα, με νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

**Χώμα**

Χώμα κήπου γενικής χρήσης

**Λίπασμα**

Όταν το φυτό ανθοφορεί, προσθέτετε λίπασμα κάθε 20 ημέρες

**Ανθοφορία**

Στο φυσικό περιβάλλον, το χειμώνα. Στο θερμοκήπιο, όλο το έτος

**Πολλαπλασιασμός**

Με διαίρεση των στελεχών, με σπόρο, με μόσχευμα κεφαλής και με καταβολάδες

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 &amp; Κόλλαι 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

06

## ΒΡΩΜΕΛΙΑ

**Βοτανική ονομασία**

Aechmea spp.

**Προέλευση** Κεντρική & Νότια Αμερική, νήσος του Ν. Ινδικού**Δυσκολία καλλιέργειας**  
Μέτρια

Έχει μία ροζέτα με μακριά και σαρκώδη φύλλα, με ακανθώδη περιφέρεια και γκρι-πράσινο χρώμα με ασημί ρίγες. Τα φύλλα, ενωμένα στη βάση, σχηματίζουν ένα κεντρικό κώνο, ο οποίος συγκρατεί το νερό των ενήλικων φυτών. Κάθε 2-3 χρόνια, στο κέντρο της ροζέτας, δημιουργείται μία ιδιαίτερη ταξιανθία, η οποία αποτελείται από πολλά ημιξυλώδη σέπαλα, κοκκινωπού χρώματος, μεταξύ των οποίων προβάλλουν μικρά λιλά ή λευκά άνθη. Η ταξιανθία παραμένει για μερικούς μήνες.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin****Καλλιέργεια**

Τοποθετήστε το φυτό σε φωτεινή θέση και σε θερμοκρασία ποτέ χαμηλότερη από 16-18°C.

Από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο, ποτίζετε το κατά το απόγευμα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, αφήνοντάς το να στραγγίξει καλά και αφαιρώντας το μέρος του υγρού που απομένει στο πιάτο της γλάστρας. Επιπλέον, στην κεντρική κοιλότητα του φυτού δεν πρέπει ποτέ να λείπουν τουλάχιστον 2 cm νερό.

Το καλοκαίρι ψεκάζετε με νερό τα φύλλα ολόκληρου του φυτού, για να διατηρήσετε την υγρασία σε υψηλά επίπεδα. Ποτίζετε και ψεκάζετε το φυτό μόνο με βρόχινο νερό, επειδή το νερό της βρύσης περιέχει άλατα.

Η ταξιανθία παραμένει επί μήνες, στη συνέχεια ξεραίνεται και μπορείτε να την αφαιρέσετε. Μετά την ανάπτυξή της, το φυτό χαλάει, αλλά αναπτύσσει κάποιους βλαστούς βάσης, τους οποίους μπορείτε να αφαιρέσετε και να δημιουργήσετε με αυτούς νέα φυτά.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Σήψη των ριζών και του λαιμού: υπερβολικό πότισμα ή ανεπαρκής αποστράγγιση του εδάφους ή του δοχείου. Το πρόβλημα εξαλείφεται αν προσέξετε τις απαιτήσεις καλλιέργειας, διατηρώντας πάντοτε τη σωστή αποστράγγιση του χώματος, χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο χώμα και αφαιρώντας τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα. Όταν η ασθένεια προσβάλλει το αγγειακό σύστημα του φυτού, το φυτό συνήθως καταστρέφεται οριστικά. Επομένως, η καταπολέμηση είναι αποκλειστικά προληπτική.

Κιτρινασμένα φύλλα και ξερά κατά μέρη, παρουσία αποικιών ασιπιδίων στα φύλλα: ψώρα. Αφαιρείται με το χέρι, με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη ή με θεραπείες ορυκτέλαιου σε συνδυασμό με ειδικό εντομοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Πολύ όμορφο και ιδιαίτερο φυτό με εντυπωσιακό ανθισμένο κόκκινο μίσχο που κρατάει πολλούς μήνες**
**Έκθεση**

Σε θέση με αρκετό φως, αλλά όχι σε άμεση έκθεση στον ήλιο

**Θερμοκρασία**

Ποτέ χαμηλότερη από 16-18°C. Ιδανική αν παραμένει σταθερά γύρω στους 20°C

**Νερό**

Μη χρησιμοποιείτε σκληρό νερό. Αποφύγετε να το βρέξετε πολύ. Γεμίστε τον κάλυκα που αποτελείται από τα φύλλα με 2 cm νερό

**Χώμα**

Χώμα για κήπους με βάση την τύρφη και ένα μέρος χώματος από πευκοβελόνες ή φύλλα

**Λίπασμα**

Την άνοιξη και το καλοκαίρι, προσθέστε λίγο λίπασμα κάθε 2 εβδομάδες. Μη λιπαίνετε το χειμώνα

**Ανθοφορία**

Από το Μάιο ως τον Οκτώβριο. Κάθε ροζέτα ανθοφορεί μόνο μία φορά

**Πολλαπλασιασμός**

Μετά την ανθοφορία, τοποθετήστε τους βλαστούς βάσης σε ένα μίγμα τύρφης και άμμου σε ίσα μέρη, για να αναπτύξουν ρίζες

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

07

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ

## Βοτανική ονομασία

*Euphorbia pulcherrima*

## Προέλευση

Μεξικό

## Δυσκολία καλλιέργειας

Μέτρια

Θαμνώδες φυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται από φύλλα σε χρώμα έντονο πράσινο, βελουτέ και με αρκετά ιδιαίτερο σχήμα, οβάλ, αλλά με άκρα με μεγάλες κυματώσεις. Τα άνθη δεν είναι πολύ έντονα, είναι κίτρινα, ενωμένα σε μία συστάδα στο κέντρο ενός κάλυκα από μεγάλα σέπαλα, με ποικίλο μέγεθος, τα οποία μπορούν να έχουν χρώμα έντονο κόκκινο, σομόν, ερυθρό ή λευκό. Τα φύλλα είναι διατεταγμένα κατά τρόπο που να δημιουργούν την εντύπωση απλού ή διπλού άνθους

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό μακριά από τα ρεύματα αέρα ή από περιοχές με απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Ποτίζετε ανά δύο ή τρεις μέρες, αλλά με φειδώ.

Στις αρχές Οκτωβρίου πρέπει να το τοποθετήσετε σε θερμοκήπιο, για να προκαλέσετε την εμφάνιση των διακοσμητικών σεπάλων. Αν δεν

διαθέτετε θερμοκήπιο και αν το τοπικό κλίμα είναι αρκετά ήπιο, μπορείτε να προσπαθήσετε να προκαλέσετε την ανθοφορία του φυτού, σκεπάζοντάς το με ένα πλαστικό κάλυμμα και διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους 16°C.

Πραγματοποιείτε τη μεταφύτευσή του την άνοιξη κάθε 2-3 χρόνια.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Σήψη του λαιμού και των ριζών: σήψη της βάσης (μυκητολογική ασθένεια). Μειώστε το πότισμα, βελτιώστε την αποστράγγιση του χώματος ή του δοχείου και καταστήστε δυνατή την καλή κυκλοφορία αέρα μέσα στο φύλλωμα. Αφαιρέστε τα φυτά ή τα μέρη του φυτού που εκδηλώνουν συμπτώματα και κατά τη μεταφύτευση εξασφαλίστε υγιές χώμα με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο εδάφους.

Εκδήλωση πολλών καφετιών κηλίδων στην επιφάνεια των φύλλων, τα οποία στη συνέχεια νεκρώνονται: βακτηριακή κηλιδωση των φύλλων του αλεξανδρινού (βακτηριακή ασθένεια). Η καταπολέμηση αυτής της ασθένειας είναι προληπτική, καθώς δεν υπάρχουν

αποτελεσματικές χημικές θεραπείες. Πρέπει να προσέξετε να μην ρίχνετε υπερβολικό λίπασμα και, σε περίπτωση εμφάνισης της ασθένειας, πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως τα φυτά ή τα μέρη του φυτού που εμφανίζουν συμπτώματα. Αποφύγετε τη στασιμότητα νερού, η οποία αποτελεί παράγοντα προδιάθεσης για την εκδήλωση της ασθένειας.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Τα όμορφα χρωματιστά του φύλλα χαρίζουν μια γιορτινή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα



#### Έκθεση

Σε ηλιόλουστη θέση, αλλά όχι με άμεση έκθεση στον ήλιο. Το καλοκαίρι, αν το κλίμα το επιτρέπει, σε εξωτερικό χώρο με μέτρια σκιά



#### Θερμοκρασία

Όχι μικρότερη από 13°-14°C



#### Νερό

Διατηρείτε συνεχώς υγρό το χώμα ακόμα και το χειμώνα. Αποφύγετε τη στασιμότητα νερού



#### Χώμα

Ελαφρύ μίγμα με κυρίαρχη την παρουσία τύρφης. Χώμα και άμμο στο βάθος της γλάστρας



#### Λίπασμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υγρό λίπασμα



#### Ανθοφορία

Τέλη Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου



#### Πολλαπλασιασμός

Μέσω ημιξυλώδους μοσχεύματος στα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

08

ΚΛΙΒΙΑ

**Βοτανική ονομασία**

Clivia spp.

**Προέλευση**

Νότια Αφρική

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Χαρακτηρίζεται από μακριά και σαρκώδη λεπτά, γυαλιστερά φύλλα, στραμμένα προς τα έξω. Το κολοκάιρι το φυτό παράγει καινούργια φύλλα, ενώ το φθινόπωρο/χειμώνα πεθαίνουν τα πιο παλιά. Κάθε χρόνο, την άνοιξη, η κλίβια βγάζει μία στεφάνη, συμπαγή και μακριά μέχρι 50 cm, όπου προβάλλει μία ομπρελοειδής ταξιανθία, η οποία αποτελείται από κωνικά άνθη χρώματος έντονου πορτοκαλί.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin****Καλλιέργεια**

Τοποθετήστε το φυτό σε καλά φωπιζόμενο χώρο προστατευμένο από ρεύματα και ριπές κρύου αέρα.

Για να μπορέσει να έχει πλούσια ανθοφορία, αφήστε το σε ανάπαυση τον Οκτώβριο, ποτίζοντάς το λίγο και αποφεύγοντας την προσθήκη λιπάσματος.

Όταν η στεφάνη φτάσει τα 15 cm, αυξήστε το πότισμα, προσέχοντας να μην παραμένει στάσιμο νερό στο πιάτο της γλάστρας. Μόλις πέσουν τα άνθη, κόψτε τη στεφάνη για να μην σπασαλάει το φυτό ενέργεια.

Πραγματοποιήστε μεταφύτευση κάθε 3-4 χρόνια το Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Κιτριτισμένα φύλλα και ξερά κατά μέρη, παρουσία αποικιών ασιπιδίων που αφήνουν μία κολλώδη ουσία: ψώρα. Εξαλείφεται με το χέρι ή με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη. Σε περίπτωση βαριάς προσβολής, ακολουθήστε θεραπεία με ορυκτέλαιο.

Σήψεις και ανθρακώσεις: πλεόνασμα ή έλλειψη νερού. Προσέξτε να μην βρέχετε υπερβολικά ή πολύ λίγο το φυτό, αποφύγετε τα στάσιμα νερά.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Πολύ όμορφο, μεγάλο άνθος με μορφή καμπάνας σε έντονο πορτακαλί χρώμα****Έκθεση**

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά το φως: μπορεί να διατηρηθεί σε περιοχές με πολύ φως ή με σχετική σκιά

**Θερμοκρασία**

Το χειμώνα, γύρω στους 10°C, ενώ μόλις εμφανιστεί η ανθοφόρος στεφάνη, πρέπει να αυξηθεί στους 14-16°C

**Νερό**

Το καλοκαίρι ποτίζετε με φειδώ, ενώ το φθινόπωρο και την άνοιξη ποτίζετε μόνο αν ξεραθεί το χώμα

**Χώμα**

Χώμα κήπου γενικής χρήσης

**Λίπασμα**

Προσθέτετε τακτικά υγρό λίπασμα στο νερό ποτίσματος

**Ανθοφορία**

Από τα τέλη του χειμώνα ως τα τέλη του καλοκαιριού

**Πολλαπλασιασμός**

Με σπόρο, με διαίρεση των ριζών που εμφανίζουν νέους βλαστούς ή και με διαίρεση των παλιών στελεχών

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC







© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

09

## ΕΥΦΟΡΒΙΑ

### Βοτανική ονομασία

Euphorbia spp.

### Προέλευση

Νότια Αφρική, Μαδαγασκάρη

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Γένος που περιλαμβάνει πάνω από 2000 είδη επισημων, διετών και πολυετών ποωδών φυτών. Το φυτό αποτελείται από ένα συνήθως ευθύ κορμό, είναι κοντό, με πολλές διακλαδώσεις που παρουσιάζουν ραβδώσεις στην επιφάνεια, με συνεχές ή οδοντωτό περίγραμμα φύλλων, όπου βρίσκονται κοντά και κοντρά αγκάθια και, μερικές φορές, αδύναμα φύλλα. Σε κάποια είδη τα κλαδιά παρουσιάζουν τμήματα με κτηρινωπές διαστίξεις.

### Οι συμβουλές Leroy Merlin

#### Καλλιέργεια

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε εξωτερικούς χώρους μόνο αν το κλίμα είναι εύκρατο, ενώ σε περιοχές με ψυχρό κλίμα, πρέπει να διατηρείται εντός του σπιτιού.

Εκτός από αυτό, δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα: έχει ανάγκη από συχνό πότισμα και πολύ φως.

Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε τη σκόνη που μπορεί να κατακαθίσει στα κλαδιά, χρησιμοποιώντας ένα πινελάκι.

Κάνετε μεταφύτευση μία φορά το χρόνο, την άνοιξη, χρησιμοποιώντας γλάστρα μεγαλύτερη από την προηγούμενη.

#### Ασθένειες και συμπτώματα

Σήψη του λαιμού, των ριζών και των φύλλων: υπερβολικό πότισμα ή ανεπαρκής αποστράγγιση του εδάφους ή του δοχείου. Εξαλείφονται προσέχοντας τις απαιτήσεις καλλιέργειας του φυτού. Πριν από τη φύτευση, βεβαιωθείτε ότι το χώμα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και, σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, αποστειρώστε το χρησιμοποιώντας ένα μυκητοκτόνο εδάφους.

Κτηρινισμένα φύλλα και ξερά κατά μέρη, παρουσία αποικιών ασιπιδίων που αφήνουν μία κολλώδη ουσία: ψώρα. Εξαλείφεται με το χέρι ή με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη. Σε περίπτωση βαριάς προσβολής, ακολουθήστε θεραπεία με ένα ουρτέλαιο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

#### Εξαιρετικά εύχρηστο φυτό χάρη στις πολύ διαφορετικές διαστάσεις του



#### Έκθεση

Απαιτεί πολύ φως και δεν αντέχει την άμεση έκθεση στον ήλιο



#### Λίπασμα

Προσθέτετε μία φορά το μήνα ένα υγρό λίπασμα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο



#### Θερμοκρασία

Η βέλπστη θερμοκρασία είναι γύρω στους 18°-20°C



#### Ανθοφορία

Από τον Αύγουστο ως τον Οκτώβριο



#### Νερό

Ποτίζετε χωρίς υπερβολές από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, και μειώστε σχεδόν εντελώς τα ποτίσματα το χειμώνα



#### Πολλαπλασιασμός

Με σπόρο



#### Χώμα

Απαιτείται υπόστρωμα όξινης σύστασης

[www.leroyermerlin.gr](http://www.leroyermerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 &amp; Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

10

ΜΠΙΓΚΟΝΙΑ

**Βοτανική ονομασία**

Begonia spp.

**Προέλευση**

Υβρίδιο ανθοκηπίου

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Μέτρια-χαμηλή

Μεγαλώνουν αργά και ανθίζουν συνεχώς. Γεμάτες λουλουδάκια, με φύλλα πράσινα ή κοκκινωπά-χάλκινα, ιδανικές για μπορντούρες, παρτέρια, γλάστρες και μπαλκόνια. Άνηθ σε χρώματα κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, λευκό ή δίχρωμα, μονά ή διπλά, με πτυχώσεις, κυματιστά ή περικλεισμένα. Οι μπιγκόνιες διακρίνονται σε 3 ομάδες: κονδυλώδεις, ριζωματώδεις και με διακλαδιζόμενες ρίζες. Οι κονδυλώδεις έχουν πολύ μεγαλύτερα άνθη, που μοιάζουν με τριαντάφυλλα, καμέλιες ή γαρύφαλλα.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin****Καλλιέργεια**

Τοποθετήστε το φυτό σε περιβάλλον με πολύ, αλλά διαχεόμενο φως. Προσέξτε να μην πληττείται από ρεύματα κρύου αέρα, τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν πτώση των ανθέων.

Διαπρέιτε το χώμα συνεχώς νωπό, αλλά όχι υπερβολικά υγρό ούτε και ξερό, προσέχοντας να μην βρέχετε τα φύλλα και τα άνθη.

Από το ένα πότισμα ως το επόμενο, η επιφάνεια της ρίζας πρέπει να έχει χρόνο να στεγνώσει.

Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε τα ξερά άνθη που μπορούν να προκαλέσουν σήψη λόγω βοτρυτίτη.

Πραγματοποιήστε τη μεταφύτευση κατά πρότμηση πιν άνοιξη.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Σήψη του λαιμού και των ριζών: υπερβολικό πότισμα ή ανεπαρκής αποστράγγιση του εδάφους ή του δοχείου. Αντιμετωπίζεται με προσοχή στα ποτίσματα, αποφυγή του στάσιμου νερού και, σε περίπτωση ισχυρών προσβολών, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μυκητοκτόνα.

Βοτρυτίτης ή γκρι μούχλα στα φύλλα: αυξημένη υγρασία του περιβάλλοντος. Θεραπεύεται με καλό αερισμό του φυλλώματος και με προσεκτική δοσομέτρηση των ποτισμάτων.

Λευκό χνούδι σε φύλλα και υποκοτύλια: ωίδιο ή λευκή σήψη. Χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ένα ειδικό ωιδιοκτόνο.

Ελαιώδεις κηλίδες στα φύλλα: βακτήρια και ιοί. Πρακτικά μη θεραπεύσιμες ασθένειες οι οποίες, όμως, μπορούν να προληφθούν χρησιμοποιώντας για πολλαπλασιασμό υγιή φυτά, αερίζοντας τους χώρους καλλιέργειας, αποφεύγοντας την πρόκληση τραυματισμών στα φυτά και αφαιρώντας και περιορίζοντας τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Πλούσια ανθοφορία με  
μεγάλη γκάμα χρωμάτων.  
Ιδανικό για δώρα**
**Έκθεση**

Στο σπίτι: ηλιόλουστη θέση, αλλά όχι άμεση έκθεση στον ήλιο. Σε εξωτερικό χώρο: σε θέση προστατευμένη από τον αέρα

**Θερμοκρασία**

Ιδανικά από 14 ως 24°C. Μπορεί να αντέξει τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, πρέπει όμως να βρίσκεται σε προστατευμένες θέσεις

**Νερό**

Συχνά ποτίσματα το καλοκαίρι, που μειώνονται στο ελάχιστο κατά το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι σημαντικό να ψεκάζετε τα φύλλα

**Χώμα**

Με καλή αποστράγγιση, εμπλουτισμένο με τύρφη ή με χώμα από φύλλα, για να αυξηθεί η αποστράγγιση

**Λίπασμα**

Προσθέτετε συνεχώς υγρό λίπασμα ανά 2 εβδομάδες, μέχρι την ανθοφορία

**Ανθοφορία**

Από τα τέλη του φθινοπώρου ως τα τέλη της άνοιξης

**Πολλαπλασιασμός**

Με φυλλώδες μίσχευμα την άνοιξη

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



## Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

11

## ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

**Βοτανική ονομασία**

Hippeastrum

**Προέλευση**

Τροπικές χώρες

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Με εντυπωσιακά κόκκινα ή ροζ λουλούδια, φωτίζει τον εσωτερικό σας χώρο καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα. Φυτρώνει εύκολα και ανθοφορεί λίγες μόνο εβδομάδες μετά το φύτεμα. Οι μεγαλύτεροι βολβοί είναι πιο γόνιμοι και βγάζουν πιο εντυπωσιακά λουλούδια. Ο βολβός αποθηκεύεται εύκολα και μπορεί να ανθοφορήσει πάνω από μια φορά.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin****Καλλιέργεια**

Φυτέψτε από τα τέλη του φθινοπώρου έως την αρχή της άνοιξης, σε γλάστρα 3 με 5cm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του βολβού. Χρησιμοποιήστε χώμα για φυτά εσωτερικού χώρου και προσθέστε χαλίκια για καλή αποστράγγιση. Το επάνω μισό τμήμα του βολβού πρέπει να είναι πάνω από το χώμα.

Τοποθετήστε το φυτό σε σημείο που το βλέπει ο ήλιος, κοντά σε παράθυρο ή σε φωτεινό δωμάτιο.

Μέτριο πότισμα πριν την ανθοφορία ώστε να διατηρηθεί υγρό το χώμα και να μην υπάρχει στάσιμο νερό. Όταν ο νέος βλαστός αναπτυχθεί, αυξήστε το πότισμα και χρησιμοποιήστε λίπασμα. Η ανθοφορία επέρχεται συνήθως 8 με 10 εβδομάδες μετά το φύτεμα.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Καφέ ή μαραμμένα φύλλα: υπερβολικό πότισμα και πιθανό σάπισμα του βολβού. Αφήστε το χώμα να στραγγίσει τελείως πριν αρχίσετε ξανά να το ποτίζετε, με φειδώ. Αν ο βολβός έχει σαπίσει, αφαιρέστε το κατεστραμμένο τμήμα του ξύνοντας με μαχαίρι.

Αδύναμο φύλλωμα: έλλειψη φωτός. Τοποθετήστε το φυτό σε θέση με περισσότερη ηλιοφάνεια.

Μίσχοι λουλουδιών καλυμμένοι με κόκκινες κηλίδες: μύκητας. Περιορίστε το πότισμα και ελέγξτε την αποστράγγιση του εδάφους. Χρησιμοποιήστε ειδικό μυκητοκτόνο σκεύασμα.

Σάπισμα του βολβού: ακάρεα. Χρησιμοποιήστε ειδικό ακαρεοκτόνο προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Τα εντυπωσιακά κόκκινα ή ροζ  
λουλούδια της φωτίζουν  
τον εσωτερικό χώρο καθόλη  
τη διάρκεια του χειμώνα**
**Έκθεση**

Σε ηλιόλουστη θέση, αλλά όχι άμεση έκθεση στον ήλιο. Σε εξωτερικό χώρο: σε θέση προστατευμένη από τον αέρα

**Θερμοκρασία**

Ιδανικά μεταξύ 21 και 26°C κατά την ανάπτυξη, μεταξύ 18 και 20°C στην ανθοφορία

**Νερό**

Διατηρείτε πάντοτε υγρό το χώμα αλλά με καλή αποστράγγιση. Ποτίστε περισσότερο κατά την ανθοφορία

**Χώμα**

Ειδικό χώμα για φυτά εσωτερικού χώρου, με χαλίκια για καλύτερη αποστράγγιση

**Λίπασμα**

Ανά δυο εβδομάδες κατά την ανάπτυξη του φυτού μέχρι την ανθοφορία

**Ανθοφορία**

8 με 10 εβδομάδες μετά το φύτεμα από τα τέλη του φθινοπώρου ως την αρχή της άνοιξης

**Πολλαπλασιασμός**

Με διαίρεση των νέων μικρών βολβών από τον κύριο βολβό όταν αυτοί εμφανίζονται, και φύτεμα σε άλλη γλάστρα

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλαι 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Ανθοφόρα εσωτ. χώρου

12

ΟΡΧΙΔΕΑ

## Βοτανική ονομασία

Phalaenopsis spp.

## Προέλευση

Λεκάνη της Μεσογείου

## Δυσκολία καλλιέργειας

Αυξημένη

Τα λουλούδια της έχουν σχήμα πεταλούδας με ανοιχτά φτερά, και το χρώμα τους ποικίλει ανάλογα το είδος. Ταιριάζει σε γλάστρα ή σε μπουκέτο. Ανθίζει συνήθως το χειμώνα και η ανθοφορία μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Αποφύγετε το υπερβολικό πότισμα γιατί ενδέχεται να σαπίσουν οι ρίζες.

Μην αφήνετε νερό μεταξύ των δυο κεντρικών φύλλων μετά το πότισμα: δημιουργείται μούχλα και κινδυνεύει το φυτό.

Μη βάζετε την orchidea στον κήπο το καλοκαίρι, μπορεί να καεί πολύ εύκολα.

Οι ρίζες πολύ συχνά εξέρχονται από τη γλάστρα: είναι φυσιολογικό, μην τις κόβετε.

Κάθε χρόνο βγάζει τουλάχιστον ένα νέο

ζεύγος φύλλων. Τα καινούργια φύλλα πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από τα προηγούμενα. Αν το φυτό δεν βγάλει καινούργια φύλλα ή αν τα φύλλα είναι μικρότερα, ελέγξτε την κατάσταση των ριζών και μεταφυτέψτε αν χρειάζεται.

Μεταφυτέψτε κάθε ένα ή δύο χρόνια ώστε να ανανεώνεται το χώμα και να υπάρχει περισσότερος χώρος για τις ρίζες.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Αδύναμο φυτό: πιθανό σάπισμα των ριζών. Απελευθερώστε τις ρίζες για να ελέγξετε την κατάστασή τους. Αν οι ρίζες σαπίζουν, είναι επείγον να αλλάξετε το χώμα.

Κιτρινωμένα φύλλα: πιθανό σάπισμα του φυτού. Αφαιρέστε τα άρρωστα φύλλα.

Φύλλα λεπτά και σκούρα πράσινα, λεπτοί μίσχοι, απουσία λουλουδιών: έλλειψη φωτός. Η απευθείας έκθεση στον ήλιο μπορεί να είναι ευεργετική το χειμώνα όταν ο ήλιος είναι ήπιος.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Πολύ όμορφα μεγάλα άνθη σε σχήμα πεταλούδας, σε έντονες αλλά και παλ αποχρώσεις. Ιδανική για δώρο**



#### Έκθεση

Σε πλήρους θάψης, αλλά όχι άμεση έκθεση στον ήλιο



#### Λίπασμα

Προσθέστε λίπασμα σε κάθε πότισμα κατά την ανθοφορία του φυτού



#### Θερμοκρασία

Ιδανικά 25 με 30°C την ημέρα, και 18 έως 25°C το βράδυ. Όχι κάτω από 16°C



#### Ανθοφορία

Κυρίως το χειμώνα



#### Νερό

Όχι υπερβολικό. Βρέξτε τη ρίζα και αφήστε το χώμα να στεγνώσει λίγο πριν το επόμενο πότισμα



#### Πολλαπλασιασμός

Νέα φυτά και ρίζες εμφανίζονται στην άκρη των παλιών μίσχων. Κόψτε και φυτέψτε σε καινούργια γλάστρα



#### Χώμα

Ειδικό χώμα ή κομμάτια φλοιού ξύλου

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

