

Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin

Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

01

Γ Ε Ρ Α Ν Ι

Βοτανική ονομασία

Pelargonium spp.

Προέλευση

Κίνα

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Ποώδες πολυετές φυτό γνωστό σε 2 κύριες ποικιλίες: ζωνωτό και αναρριχώμενο. Τα ζωνωτά γεράνια, που οφείλουν την ονομασία τους σε μία κυκλική περιοχή στα φύλλα, έχουν ευθεία ανάπτυξη, στρογγυλούς βλαστούς, άνθη που αναπτύσσονται σε ποικιλόχρωμες ομπρέλες, στρογγυλά βελουτέ φύλλα και εύοσμα στην αφή. Τα αναρριχώμενα γεράνια, πολύ διαδεδομένα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν, αντίθετα, κρεμαστή ανάπτυξη, λεία και γυαλιστερά φυλλαράκια, με μορφή κισσού, και μικρότερα άνθη.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Διατηρείτε υγρό το χώμα, αποφεύγοντας πάντοτε τα στάσιμα νερά, με εναλλάξ ποτίσματα κάθε 2-3 ημέρες την άνοιξη και καθημερινά το καλοκαίρι.

Καλό είναι το νερό να έχει σταθερή θερμοκρασία 18°-20°C και να μην είναι σκληρό: αν είναι δυνατό, αφήστε το νερό στο ποτιστήρι να κατασταλάξει για 24 ώρες.

Ποτίζετε τις απογευματινές ώρες, για να μην εξατμίζεται το νερό με τον ήλιο και οι σταγόνες στα φύλλα, που στεγνώνουν αργά, να μην το καίνε. Προσέξτε να μην καταβρέξετε τα φύλλα. Όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 5°-6°C, τοποθετήστε τα γεράνια σε προστατευμένες θέσεις, αφήνοντάς τα όλο το χειμώνα σε χώρο φωτεινό και δροσερό με θερμοκρασία όχι μικρότερη από 3°-5°C.

Ασθένειες και συμπτώματα

Ρωγμές στα φύλλα και τα υποκοτύλια: σκουλήκι των γερανιών (Cacysus marshalli). Ξεκολλήστε με το χέρι τις προνύμφες, με τη βοήθεια ενός φακού, επειδή είναι αρκετά δύσκολο να τις ξεχωρίσετε, λόγω του πράσινου χρώματός τους. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ειδικά εντομοκτόνα.

Αποικίες εντόμων στην κάτω όψη των φύλλων: μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε ένα συστηματικό εντομοκτόνο.

Παραμορφωμένα νεαρά φύλλα, κίτρινα και με σκόνη: ακάρεα. Χρησιμοποιήστε ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Υπαρξη στρογγυλών καφετί φλυκταινών στην κάτω όψη των φύλλων, στις οποίες αντιστοιχούν στην επάνω όψη κλωρωτικές κηλίδες: σκωρίαση του γερανιού (μυκητολογική ασθένεια). Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό μυκητοκτόνο.

Πολύ ανθεκτικό με πλούσια και ζωήρη ανθοφορία



Έκθεση

Στον ήλιο αναπτύσσεται καλύτερα (νότιος προσανατολισμός). Ανέχεται και τη μερική σκιά, χωρίς όμως πλούσια ανθοφορία



Θερμοκρασία

Ιδανικά στους 18°-20°C. Αντέχει ικανοποιητικά και τα πολύ ξηρά καλοκαίρια



Νερό

Το καλοκαίρι συχνά ποτίσματα, ακόμη και καθημερινά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρό νερό. Υποφέρει από τη στασιμότητα νερού



Χώμα

Χώμα γενικής χρήσης ή ειδικό για γεράνια



Λίπασμα

Ανά 12-15 ημέρες, χορηγείτε ειδικό υγρό λίπασμα



Ανθοφορία

Ανθίζει συνεχώς από τα τέλη της άνοιξης μέχρι τους πρώτους παγετούς



Πολλαπλασιασμός

Με φυλλώδες μίσχευμα

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

02

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ

Βοτανική ονομασία

Cyclamen persicum

Προέλευση

Βόρεια Αφρική και Μικρά Ασία

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Γένος που περιλαμβάνει περίπου 20 είδη ποωδών, κονδυλωδών φυτών, τα οποία παρουσιάζουν ένα θύσανο φύλλον σε σχήμα καρδιάς, με χρώμα σκούρο πράσινο, με πιτσιλιές γκριζού.

Τα άνθη λαμβάνουν διάφορα χρώματα: λευκό, ροζ, βιολετί, κόκκινο, μοβ, και μπορούν να είναι απλά ή διπλά, ανάλογα με την ποικιλία. Η περίοδος ανθοφορίας διαρκεί από το Νοέμβριο ως το Μάρτιο. Σε κατάλληλες συνθήκες, το κυκλάμινο ανθοφορεί και επί 3-4 χρόνια.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Κατά την άνοιξη, τοποθετήστε το φυτό σε εξωτερικό και ακιερό χώρο. Μειώστε τη χορήγηση νερού.

Το καλοκαίρι, το φυτό βρίσκεται σε πλήρη ανάπαυση. Ποτίζετε τόσο ώστε το χώμα να διαπρέιται υγρό.

Μόλις επέλθει η ψυχρή περίοδος, καλό είναι να εξασφαλίσετε στο φυτό αρκετό φως, όχι με άμεση έκθεση στον ήλιο, και θερμοκρασία που να μην υπερβαίνει τους 15°C. Παρέχετε λίγη υγρασία στο φυτό, τοποθετώντας στο πιάτο της γλάστρας βρεγμένα χαλίκια.

Ασθένειες και συμπτώματα

Αποχρωματισμένα φύλλα, μαραμμένοι μίσχοι και βολβοί: πλεόνασμα νερού. Κόψτε τα μαραμμένα φύλλα και μέρη και ψεκάστε με σκόνη από θειάφι.

Μαραμένα και κιτρινωμένα φύλλα: έλλειψη νερού, πολύ υψηλή θερμοκρασία και άμεση έκθεση στον ήλιο. Προστατέψτε το φυτό από το άμεσο ηλιακό φως και ποτίστε.

Φύλλα με σκούρες κηλίδες, κιτρίνισμα και ξήρανση των φύλλων: ανθράκωση (μυκητολογική ασθένεια). Αφαιρέστε τα φυτά ή τα μέρη του φυτού που παρουσιάζουν συμπτώματα, αποστραγγίστε το χώμα και, αν εκδηλώνονται από καιρό, αλλάξτε το. Η χημική αντιμετώπιση με μυκητοκτόνα δεν παρέχει πάντοτε καλά αποτελέσματα.

Καχεκτικό φυτό, ύπαρξη ασθενειών στη βάση των φύλλων και στους μίσχους: μυκητολογικές ασθένειες του λαιμού. Χρησιμοποιήστε ειδικά μυκητοκτόνα για ψεκάσμο του εδάφους.

Μια υπέροχη πινελιά χρώματος ακόμα και στη μέση του χειμώνα**Έκθεση**

Ημίφως. Σε θερμοκρασία πάνω από 15°C, τοποθετήστε το σε θέση προστατευμένη από τον ήλιο

**Θερμοκρασία**

Ιδανική 15°C. Στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι δεν ανέχεται τις αυξημένες θερμοκρασίες

**Νερό**

Άφθονο την περίοδο βλάστησης (άνοιξη) και ανθοφορίας (χειμώνας), τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα

**Χώμα**

Μαλακό και διαπερατό, πλούσιο σε τύρφη και ανάμικτο με άμμο

**Λίπασμα**

Την περίοδο πριν από την ανθοφορία, προσθέστε υγρό λίπασμα σε νερό κάθε 15 ημέρες

**Ανθοφορία**

Από το Νοέμβριο ως το Μάρτιο

**Πολλαπλασιασμός**

Με σπόρους, από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο, με διαίρεση του βολβού στα τέλη της άνοιξης

www.leroymerlin.gr


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

03

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

Βοτανική ονομασία

Chrysanthemum indicum

Προέλευση

Κίνα και Ιαπωνία

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Γένος που απαριθμεί πάνω από 200 είδη επίσηων και διετών ποωδών φυτών με θαμνώδη όψη, τα οποία παρουσιάζουν μικρά φυλλαράκια σκούρου πράσινου χρώματος και μεγάλες ταξιανθίες, οι οποίες αποτελούνται από άνθη διαφόρων χρωμάτων. Τα άνθη είναι απλά, μισογεμάτα ή γεμάτα, ανάλογα με τον αριθμό των πετάλων και τη διάταξή τους. Περίοδος ανθοφορίας είναι ο Οκτώβριος, αλλά με γενετική επιλογή, υπάρχουν υβρίδια με σταδιακή ανθοφορία από το Μάιο έως τον Οκτώβριο.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Ποτίζετε τακτικά, ιδίως την περίοδο της ανθοφορίας και, όταν το φυτό βρίσκεται στη γλάστρα, βάλτε το σε φωτεινό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Τη θερμή περίοδο, αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο και ποτίζετε τόσο ώστε το χώμα να παραμένει υγρό.

Κατά την ψυχρή περίοδο, βάλτε το φυτό σε γλάστρα, σε κλειστό, φωτεινό και αεριζόμενο περιβάλλον, για να ευνοηθεί το άνοιγμα των ανθέων. Προσθέστε αρκετό λίπασμα και νερό.

Ασθένειες και συμπτώματα

Φύλλα και άνθη με φλύκτινες σκούρου πορτοκαλί χρώματος: ακρίαση. Αφαιρέστε τα μέρη που έχουν προσβληθεί και, σε περίπτωση βαριάς προσβολής, χρησιμοποιήστε ειδικό μυκητοκτόνο.

Φύλλα με λευκά στίγματα με σκόνη: ωίδιο ή λευκή σήψη. Ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ειδικό ωιδιοκτόνο.

Φύλλα, άνθη και μίσχοι που παρουσιάζουν μούχλα γκρι χρώματος: βοτρυτής ή γκρι μούχλα. Διευκολύνετε την κυκλοφορία του αέρα στο χώρο όπου βρίσκεται το φυτό και μειώστε τα ποτίσματα, αφαιρέστε τα μέρη που έχουν προσβληθεί και, σε περίπτωση βαριάς προσβολής, χρησιμοποιήστε ειδικό μυκητοκτόνο.

Παραμορφωμένα και άτονα άνθη και νεαρά φύλλα, παρουσία αποικίας μικρών εντόμων: μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε ειδικό εντομοκτόνο.

Παρουσία σπράγγων στην επιφάνεια των φύλλων, που προκαλούν ξήρανση της περιμέτρου των φύλλων: φυλλαρόκτες του χρυσάνθεμου. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εντομοκτόνο κατά των ενήλικων εντόμων.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Φυτό με άνθη σε έντονο χρώμα.
Χαρίστε το ως φυτό σε γλάστρα ή προσφέρετε μεμονωμένα άνθη**
**Έκθεση**

Αυξημένο φως, αλλά όχι άμεση έκθεση στον ήλιο

**Λίπασμα**

Κατά την ανθοφορία, προσθέτετε ειδικό λίπασμα κάθε 2 εβδομάδες

**Θερμοκρασία**

Ιδανική 18°C. Κατά τους θερινούς μήνες, μπορεί να μεταφερθεί και σε εξωτερικούς χώρους

**Ανθοφορία**

Οκτώβριος

**Νερό**

Ποτίζετε 2-3 φορές την εβδομάδα με μικρές δόσεις νερού, αποφεύγοντας τη στασιμότητα νερού

**Πολλαπλασιασμός**

Με μοσχεύματα μίσχων ή με διαίρεση στελεχών την άνοιξη

**Χώμα**

Χρησιμοποιήστε μίγμα τύρφης, τυπικού χώματος κήπου και άμμου

www.leroymerlin.gr


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

04

P E I K I

Βοτανική ονομασία

Erica spp.

Προέλευση

Ευρώπη, Νότια Αφρική

Δυσκολία καλλιέργειας

Μέτρια

Περιλαμβάνει πάνω από 500 είδη θάμνων με λοχειοειδή φύλλα διαφόρων χρωμάτων, από λαμπερό πράσινο μέχρι γκρι, και από πορτοκαλοκίτρινο μέχρι κόκκινο.

Τα άνθη σε σχήμα καμπάνας, απλά ή διπλά, ενώνονται σε μακριές ταξιανθίες 20-30 cm. Τα χρώματα ποικίλλουν, από λευκό μέχρι ροζ και μοβ. Η περίοδος της ανθοφορίας διαρκεί από τον Ιούλιο ως το Νοέμβριο, ανάλογα με την ποικιλία.

Οι συμβουλές Leroy Merlin**Καλλιέργεια**

Ιδανικό φυτό για καλλιέργεια σε κήπους και φράχτες, αλλά και στη γλάστρα στο μπαλκόνι, μεμονωμένα ή για εμπλουτίσετε τις συνθέσεις σας με μία χρωματική νότα.

Είναι άγριο φυτό, με αντοχή στο κρύο. Τοποθετήστε το σε θέση προστατευόμενη από τον αέρα.

Διατηρείτε το χώμα υγρό, αποφεύγοντας το υπερβολικό πότισμα και τη στασιμότητα νερού. Ποτίζετε με μαλακό νερό (ιδανικά, βρόχινο).

Δεν χρειάζεται κλάδεμα, παρά μόνο για να αφαιρέσετε τις ξερές ταξιανθίες.

Ασθένειες και συμπτώματα

Τα φύλλα και τα άνθη καλύπτονται από ένα λευκό χνούδι: ωίδιο ή λευκή σήψη. Ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ειδικό ωιδιοκτόνο.

Παρουσία γκρι μούχλας σε φύλλα και άνθη: βοτρυτής ή γκρι μούχλα. Μειώστε το πότισμα, εξασφαλίστε καλό αερισμό του εναέριου μέρους του φυτού, αποστραγγίστε καλά το χώμα και, σε περίπτωση βαριάς προσβολής, χρησιμοποιήστε ειδικό μυκητοκτόνο.

Αποχρωματισμένα και γκριζωπά φύλλα και στη συνέχεια θάνατος των βλαστών: περονόσπορος των ερικοειδών. Ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό ή με ένα ειδικό προϊόν κατά του περονόσπορου.

Καχεκτικά φυτά και πτώση των φύλλων, παρουσία ασπιδίων στα υποκοτύλια με έκκριση σακχαρωδών ουσιών: λευκή ψώρα. Αφαιρέ-

στε τα έντομα με ένα σκληρό πινέλο βουτηγμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη ή χρησιμοποιήστε γρήγη παραφίνη σε συνδυασμό με ειδικό εντομοκτόνο.

Φύλλα με εμφανείς ρωγμές στην περιμέτρο ή στο εσωτερικό της επιφάνειας του φύλλου: προσβολή από το έντομο *Agrotis spp.* Αντιμετωπίζεται με ειδικό εντομοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Εκπληκτικό χειμερινό φυτό**Έκθεση**

Σε εξωτερικούς χώρους, τοποθετήστε το στον ήλιο ή το ημίφως

**Λίπασμα**

Μικρές απαιτήσεις

**Θερμοκρασία**

Άγριο φυτό που αντέχει και στις χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες

**Ανθοφορία**

Από τον Αύγουστο ως το Δεκέμβριο

**Νερό**

Ποτίζετε αραιά μετά τη φύτευση

**Πολλαπλασιασμός**

Με μόσχευμα πλαινού βλαστού, το οποίο λαμβάνεται από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο. Με παραφυάδες το Μάρτιο

**Χώμα**

Αναπτύσσεται καλά σε όλα τα χώματα, εκτός από τα ασβεστώδη. Προιμιά τα τυρφώδη και όξινα

www.leroymerlin.gr


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

05

ΓΑΡΔΕΝΙΑ

Βοτανική ονομασία

Gardenia spp.

Προέλευση

Κίνα

Δυσκολία καλλιέργειας

Αυξημένη

Αειθαλής θάμνος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από λογοχειδή, μυτερά και δερματώδη φύλλα, με χρώμα σκούρο πράσινο. Τα άνθη είναι λευκά, με έντονο άρωμα, κηρώδους σύστασης, με διάμετρο ακόμη και 10 cm. Μερικές ποικιλίες παρουσιάζουν απλά άνθη και άλλες διπλά. Τα άνθη εμφανίζονται συνεχώς από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο. Μοναδική εξαίρεση, η Gardenia jasminoides veitchiana, η οποία ανθοφορεί το χειμώνα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Για να ευνοήσετε την πλούσια ανθοφορία, πεκάζετε συχνά τα φύλλα με κλιαρό νερό, αλλά ποτέ τα άνθη.

Ταυτόχρονα, διατηρείτε όσο το δυνατόν πιο σταθερή τη θερμοκρασία, γύρω στους 18°C.

Το καλοκαίρι, τοποθετήστε το φυτό σε φωτεινή περιοχή και ποτίζετε το ώστε να διατηρείται

πάντοτε υγρό το χώμα, αποφεύγοντας ωστόσο το υπερβολικό νερό. Μπορείτε να το τοποθετήσετε σε εξωτερικό χώρο, χωρίς όμως άμεση έκθεση στον ήλιο.

Με την έλευση της κρύας περιόδου, μεταφέρετε ξανά το φυτό σε εσωτερικό χώρο.

Ασθένειες και συμπτώματα

Μπουμπούκια που δεν ανθίζουν και πέφτουν: Ξαφνικές μεταβολές θερμοκρασίας, πλεονάζον νερό. Διατηρήστε το φυτό σε σταθερό περιβάλλον και θερμοκρασία, και ποτίζετε τακτικά.

Κίτρινα νεαρά φύλλα με πράσινα νεύρα: νερό με αυξημένη σκληρότητα. Ποτίστε μία φορά με άλας νατρίου.

Κιτρινασμένα φύλλα με νηματοειδή υπολείμματα στην κάτω όψη: κόκκινος τετράνυχος. Παρέμβετε με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Φύλλα με παρουσία σκούρων ασιπιδίων στα νεύρα της κάτω όψης και στα κλαδιά: ψώρα. Αφαιρέστε τις αποικίες με ένα κομμάτι βαμβάκι εμβαπτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη ή χρησιμοποιήστε υγρή παραφίνη σε συνδυασμό με ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Αποικίες μικρών εντόμων στα κλαδιά: μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε ειδικό εντομοκτόνο.

Παρουσία κιτρινασμένων φύλλων με εκδήλωση μικρών κυκλικών σπιγμάτων: σεπορώση (μυκητολογική ασθένεια). Χρησιμοποιήστε ειδικό μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προτιμών για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Φυτό που καλλιεργείται για τα άνθη του, λευκά και αρκετά εύσμη, και για το πράσινο και λαμπερό φύλλωμά του



Έκθεση

Αυξημένο φως, αλλά όχι άμεση έκθεση στο ηλιακό φως



Θερμοκρασία

Ιδανική: 18°-20°C για ανθοφορία το καλοκαίρι.
Ελάχιστη: 10°-15°C το χειμώνα



Νερό

Ποτίζετε άφθονα το καλοκαίρι, ακόμη και 3 φορές την εβδομάδα. Το χειμώνα, 1 φορά την εβδομάδα



Χώμα

Μίγμα χώματος, μαυροχώματος και τύρφης με καλή αποστράγγιση



Λίπασμα

Από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, προσθέτετε λίπασμα κάθε 10 ημέρες και υγρό λίπασμα στο νερό του ποτίσματος



Ανθοφορία

Από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο



Πολλαπλασιασμός

Με ακραία μοσχεύματα μίσχων, από νεαρούς μίσχους, από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο ή από τον Αύγουστο ως το Σεπτέμβριο

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

06

ΠΡΙΜΟΥΛΑ

Βοτανική ονομασία

Primula malacoides

Προέλευση

Ασία, Ευρώπη

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Πρόκειται για ένα πολυετές ποώδες φυτό, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των πριμουλοειδών. Το ύψος του μίσχου ποικίλλει από 5 ως 10 cm. Η πριμουλα είναι το σύμβολο της νεότητας, καθώς είναι το πρώτο άνθος της άνοιξης. Έχει στρογγυλά, κυματοειδή φύλλα, με μακριούς ανθοφόρους μίσχους με μεγάλες ταξιανθίες με λευκά, ροζ, κόκκινα, μοβ και πορτοκαλί λουλούδια. Είναι ένα άνθος που χρησιμοποιείται κυρίως σε μπαλκόνια, βεράντες και παρτέρια.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετείτε το φυτό σε χώρο με ημίφως, δροσερό, υγρό και καλά αεριζόμενο.

Απαιτεί άφθονο και συχνό πότισμα και χώμα με καλή αποστράγγιση.

Αφαιρείτε τους μίσχους των ξερών λουλουδιών, για ενεργοποίηση νέας ανθοφορίας και επιμήκυνση της περιόδου ανθοφορίας.

Η μεταφύτευση να γίνεται το Μάιο, μετά το τέλος της ανθοφορίας, προσέχοντας να μην τοποθετήσετε το φυτό σε πολύ μεγάλη γλάστρα, για να είναι επιτυχής η επόμενη ανθοφορία.

Ασθένειες και συμπτώματα

Η πιο συννησιμένη ασθένεια είναι ο βοτρυτης ή γκρι μούχλα. Σχηματίζεται κυρίως στη βάση των φύλλων σε πολύ υγρά περιβάλλοντα με υπερβολική ποσότητα νερού. Για να αποφύγετε την ασθένεια, μην βρέχετε τα φύλλα και μην τοποθετείτε το φυτό σε υπερβολικά υγρά περιβάλλοντα.

Παρουσία αποχρωματισμένων κηλίδων στην άνω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στα αντίστοιχα σημεία στην κάτω επιφάνεια σχηματίζεται μία μούχλα με μορφή λευκής σκόνης: περονόσπορος της πριμουλας. Αφαιρέστε τα προσβεβλημένα φύλλα, βελτιώστε τον αερισμό της βλάστησης, ακολουθήστε θεραπεία με μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Παρουσία μούχλας με μορφή λευκής σκόνης στην επάνω όψη των φύλλων: ωίδιο ή λευκή σήψη. Ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ειδικό ωιδιοκτόνο.

Παρουσία πορτοκαλί φλυκταινών σε φύλλα και υποκοτύλια: σκωρίαση της πριμουλας. Ακολουθήστε θεραπεία με ειδικό μυκητοκτόνο.

Παρουσία ανώμαλων επιφανειών στα φύλλα, οι οποίες προκαλούν νέκρωση των φύλλων: ραμουλάρια (μυκητολογική ασθένεια). Ακολουθήστε θεραπεία με ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Εύκολη καλλιέργεια, μεγάλη γκάμα και ποικιλία χρωμάτων



Έκθεση

Σε ημίφως ή φωτεινή θέση, όχι όμως με άμεση έκθεση στον ήλιο



Θερμοκρασία

Το χειμώνα, όχι μικρότερη από 7°C. Το καλοκαίρι, σε χώρο δροσερό και σκιερό



Νερό

Απαιτεί πολύ νερό. Σε εσωτερικό χώρο, κάθε 2-3 ημέρες, διατηρώντας την υγρασία της γλάστρας



Χώμα

Ελαφρύ, με φύλλα και άμμο και καλή αποστράγγιση. Κατάλληλη και η τύρφη με ένα μέρος άμμο



Λίπασμα

Προσθέστε λίπασμα την άνοιξη και το φθινόπωρο



Ανθοφορία

Την αρχή της άνοιξης



Πολλαπλασιασμός

Με σπόρο

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

07

ΒΕΡΟΝΙΚΗ

Βοτανική ονομασία

Veronica spp.

Προέλευση Μικρά Ασία,
Νότια Αμερική, Ευρώπη**Δυσκολία καλλιέργειας**
Χαμηλή

Ποώδες πολυετές φυτό, μικροσκοπικού ή μεγάλου μεγέθους, με οβάλ ή λογκοειδή φύλλα. Τα άνθη έχουν σωληνοειδή κάλυκα που απολήγει σε τέσσερις επίπεδους λοβούς. Μπορούν να είναι μεμονωμένα ή να ενώνονται σε ακραίες ή παράπλευρες συστάδες.

Ανθίζουν από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο, ανάλογα με το είδος, και συνήθως το χρώμα τους είναι σε διάφορους τόνους του γαλάζιου.

Οι συμβουλές Leroy Merlin**Καλλιέργεια**

Κατά την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι φυτέψτε τα νεαρά φυτά ή πολλαπλασιάστε τα παλιά με διαίρεση των στελεχών.

Στις περιοχές με ισχυρούς ανέμους, στηρίξτε με υποστηλώματα τα ψηλά είδη.

Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε τα άνθη που έχουν ξεραθεί και να ποτίζετε κατά τις ξηρές περιόδους.

Με την έλευση της ψυχρής περιόδου, κόψτε στο επίπεδο του εδάφους τους βλαστούς των ψηλών ειδών και φυτέψτε τα νεαρά φυτά.

Ασθένειες και συμπτώματα

Φύλλα με καφετί κηλίδες: βακτηριακή κηλίωση των φύλλων (μυκητολογική ασθένεια). Με την πρώτη εμφάνιση των κηλίδων, ψεκάστε με ειδικό μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Φύλλα και μίσχοι με περιοχές καλυμμένες με λευκή σκόνη μούχλας, ξεθώριασμα και ξήρανση των άρρωστων τμημάτων: ωίδιο ή λευκή σήψη. Μόλις εμφανιστούν τα πρώιμα συμπτώματα, ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ειδικό ωιδιοκτόνο.

Το μέρος της βάσης γίνεται καφετί και σαπίζει, με τον καιρό τα φύλλα κηρινίζουν και το φυτό ξεραίνεται: σήψη της βάσης (μυκητολογική ασθένεια). Πριν από τη φύτευση των νεαρών φυτών, αποστειρώστε το χώμα με ειδικό μυκητοκτόνο. Σε περίπτωση προσβολής φυτών που έχουν ήδη φυτευτεί, αφαιρέστε τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Εύκολη καλλιέργεια, μεγάλη και πλούσια ποικιλία χρωμάτων

Έκθεση
Στον ήλιο ή στο ημίφως



Θερμοκρασία
Αντέχει στο κρύο



Νερό
Ποτίζετε το καλοκαίρι και στις περιόδους ξηρασίας



Χώμα
Κάθε τύπος χώματος για κήπο, με καλή αποστράγγιση



Λίπασμα
Πριν τη φύτευση, λίπασμα με οργανική ουσία. Επαναλάβετε την άνοιξη



Ανθοφορία
Από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο



Πολλαπλασιασμός
Με διαίρεση των στελεχών, το Μάρτιο ή τον Απρίλιο

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin

Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

08

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ

Βοτανική ονομασία

Hyacinthus Orientalis

Προέλευση

Λεκάνη της Μεσογείου

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Με χαρακτηριστικές χρωματιστές μακριές συστάδες λουλουδιών (μπλε, μοβ, άσπρο, κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ) και ευχάριστη μυρωδιά που θυμίζει άνοιξη. Το ζουμπούλι έχει διάρκεια και είναι εύκολο στην καλλιέργεια. Καλλιεργείται σε εξωτερικό χώρο σε φράχτες, ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες, καθώς και σε εσωτερικό χώρο σε ανθοδοχείο ή γλάστρα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Το φθινόπωρο ή στις αρχές του χειμώνα (όχι μέρες με παγωνιά) φυτέψτε το βολβό στο χώμα ή σε γλάστρα σε βάθος τουλάχιστον 10cm. Εναλλακτικά τοποθετήστε τον σε ανθοδοχείο: φυτρώνει και ανθοφορεί χωρίς δυσκολία.

Στο τέλος της ανθοφορίας αφαιρέστε τα μαρμαμένα λουλούδια. Μην κόψετε αμέσως τα φύλλα, βοηθούν την ανασύσταση του βολβού για την επόμενη ανθοφορία. Όταν το φύλλωμα εξασθενήσει, αφαιρέστε το βολβό και κρατή-

στε τον σε στεγνό μέρος. Εάν παραμείνει στο χώμα, η ανθοφορία τον επόμενο χρόνο δεν θα είναι τόσο πλούσια. Φυτέψτε εκ νέου το βολβό το επόμενο φθινόπωρο.

Ανθοφορία το χειμώνα («εξαναστασιακή καλλιέργεια»): κρατήστε το βολβό για αρκετές εβδομάδες στο ψυγείο (4°C), κατόπιν σε δωμάτιο με κανονική θερμοκρασία. Η βλάστηση και η ανθοφορία επέρχεται μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες. Ωστόσο, ο βολβός δεν θα μπορέσει να ανθίσει για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Ασθένειες και συμπτώματα

Κινδυνεύει από τα σαλιγκάρια και τους γυμνοσάλιαγκες. Χρησιμοποιήστε δόλωμα για σαλιγκάρια μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου.

Φύλλα και μίσχοι με μούχλα γκρι χρώματος: βοτρυτίες ή γκρι μούχλα. Διευκολύνετε την κυκλοφορία του αέρα στο χώρο όπου βρίσκεται το φυτό και μειώστε τα ποτίσματα, αφαιρέστε με ένα μαχαίρι τα μέρη που έχουν προσβληθεί. Συνήθως όμως το φυτό είναι δύσκολο να θεραπευτεί.

Παραμορφωμένα φύλλα: νηματώδης στελεχών και βολβών. Εάν προσβληθεί ο βολβός το φυτό είναι δύσκολο να αποκατασταθεί.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Ευχάριστο άρωμα και εύκολη καλλιέργεια. Μεγάλη και πλούσια ποικιλία χρωμάτων



Έκθεση

Στον ήλιο ή σε σκιερό μέρος



Θερμοκρασία

Την περίοδο ανθοφορίας μεταξύ 15°C και 18°C ώστε να διατηρηθεί περισσότερο η ανθοφορία



Νερό

Κανονικό πότισμα. Ποτίστε άφθονα σε άνυδρες περιόδους.



Χώμα

Κάθε τύπος χώματος με καλή αποστράγγιση και καλό αερισμό (συστήνεται η προσθήκη χαλικιού)



Λίπασμα

Δεν χρειάζεται λίπασμα. Κομπόστ κατά τη διάρκεια του χειμώνα αν το φυτό καλλιεργείται σε εξωτερικό χώρο



Ανθοφορία

Φεβρουάριο με Μάρτιο



Πολλαπλασιασμός

Με φύτεμα βολβών τον Οκτώβριο - Νοέμβριο

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

09

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

Βοτανική ονομασία

Narcissus spp.

Προέλευση Ευρώπη,
Βόρεια Αφρική, Δυτική Ασία**Δυσκολία καλλιέργειας**
Χαμηλή

Ανθίζει στα τέλη του χειμώνα και έχει εύοσμα και πρωτότυπα άνθη, ανηπροσωπευτικά της άνοιξης, που φωτίζουν τον κήπο ενώ τα περισσότερα φυτά δεν έχουν ακόμα ανθίσει. Κίτρινα ή άσπρα, ανάλογα με το είδος, συνήθως καλλιεργείται σε εξωτερικούς χώρους καθώς χρειάζεται δροσερό περιβάλλον για να αναπτυχθεί. Πολύ ανθεκτικός σε χαμηλές θερμοκρασίες, σπάνια προσβάλλεται από ασθένειες.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Φυτέψτε τους βολβούς το φθινόπωρο, στο χώμα ή σε γλάστρα, σε βάθος 10-15cm. Προσθέστε μικρά χαλίκια γύρω από το βολβό για καλή αποστράγγιση.

Όταν ανθίσει ποτίστε με μέτρο. Αποφύγετε τα υπερβολικά ποτίσματα για να μην καταστραφεί το φυτό. Φροντίστε επίσης για καλή αποστράγγιση. Τα άνθη αντέχουν σε ανθοδοχείο πάνω από 10 ημέρες.

Στο τέλος της ανθοφορίας, τα μαραμμένα λουλούδια μπορούν να κοπούν. Μην κόψετε αμέσως τα φύλλα, βοηθούν την ανασύσταση του βολβού για την επόμενη ανθοφορία. Αφαιρέστε τα όταν όλα τα φύλλα έχουν μαραμεί.

Το καλοκαίρι οι βολβοί μπορούν να παραμείνουν στο χώμα ή να διατηρηθούν σε δροσερό μέρος και να φυτευτούν ξανά το φθινόπωρο.

Ασθένειες και συμπτώματα

Ανθεκτικός στις ασθένειες. Όταν καλλιεργείται σε εξωτερικό χώρο κινδυνεύει από σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγκες. Χρησιμοποιήστε δόλωμα για σαλιγκάρια.

Καχεκτικό φύλλωμα: σάπισμα του βολβού λόγω υπερβολικού ποτίσματος ή κακής αποστράγγισης. Κόψτε τα μέρη που έχουν καταστραφεί και αραιώστε τα ποτίσματα.

Παραμορφωμένα ή ηρησμένα φύλλα: νηματοδής βολβών. Αφαιρέστε τα κομμάτια του φυτού που έχουν προσβληθεί.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Από τα πιά ανθεκτικά λουλούδια.
Τα άνθη του φωτίζουν
τον κήπο σας πριν ανθίσουν
τα υπόλοιπα φυτά!**

Έκθεση
Στον ήλιο ή σε μερική σκιά

Λίπασμα
Μικρές απαιτήσεις,
μόνο μετά την ανθοφορία

Θερμοκρασία
Ανθεκτικό στο κρύο

Ανθοφορία
Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο

Νερό
Ποτίστε με φειδώ και αποφύγετε τη στασιμότητα του νερού

Πολλαπλασιασμός
Με μοσχεύματα από βολβίδια που αφαιρούνται από τον κύριο βολβό μετά την ανθοφορία

Χώμα
Φρέσκο και ελαφρύ
με καλή αποστράγγιση

www.leroymerlin.gr


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλαι 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

10

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Βοτανική ονομασία

Dianthus caryophyllus

Προέλευση

Ασία

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Έχει χαρακτηριστικά πολύχρωμα λουλούδια, ροζ, κόκκινα, άσπρα ή κίτρινα. Τα πέταλα έχουν διαφορετικά σχέδια που προκύπτουν από υβριδισμό, ταιριάζουν απόλυτα σε κήπο, μέσα στο σπίτι και σε μπουκέτο. Οι μίσχοι έχουν 50cm μήκος και τα λουλούδια έχουν ένα ευχάριστο άρωμα. Το μεσογειακό κλίμα είναι ιδανικό για την καλλιέργεια της γαρυφαλλιάς.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Φυτέψτε από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο, όπως επίσης και το φθινόπωρο. Επιλέξτε μέρος ηλιόλουστο και χώμα πλούσιο με καλή αποστράγγιση.

Ποτίστε άφθονα κατά την καλοκαιρινή ανθοφορία. Σε θερμοκρασίες πάνω από 35°C ποτίζετε καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, αφαιρέστε τα μαραμμένα λουλούδια.

Ασθένειες και συμπτώματα

Λουλούδια που γέρνουν: έλλειψη νερού ή θρεπτικών συστατικών. Αυξήστε την συχνότητα ποτίσματος και προσθέστε το κατάλληλο λίπασμα.

Κίτρινες κηλίδες: σκουριά, όχι πάντα επικίνδυνη αλλά αντιασθητική. Αντιμετωπίστε με την κατάλληλη θεραπεία.

Τα φυτά που καλλιεργούνται σε εξωτερικό χώρο κινδυνεύουν από μελίγκρα. Αντιμετωπίστε με την κατάλληλη θεραπεία.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Τα πολύχρωμα άνθη της ταιριάζουν απόλυτα στον κήπο ή στο σπίτι. Προσφέρονται και σε μπουκέτο.
**Έκθεση**

Στον ήλιο ή σε μερική σκιά

**Λίπασμα**

Το καλοκαίρι, προσθέστε υγρό λίπασμα κάθε 15 μέρες ή και συχνότερα

**Θερμοκρασία**

Ανθεκτικό στο κρύο. Χρειάζεται ζεστές θερμοκρασίες για να ανθίσει το καλοκαίρι

**Ανθοφορία**

Από τον Μάιο ως τον Σεπτέμβριο

**Νερό**

Ποτίστε γενναίως όταν ανθοφορεί. Μετά την ανθοφορία, μειώστε το πότισμα

**Πολλαπλασιασμός**

Με βλαστοφόρο μίσχευμα την άνοιξη σε προστατευμένο μέρος

**Χώμα**

Αμμώδες με καλή αποστράγγιση

www.leroymerlin.gr


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

11

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Βοτανική ονομασία

Rosa spp

Προέλευση

Ασία

Δυσκολία καλλιέργειας

Μέτρια

Χάρη στα ευωδιαστά της λουλουδία χρώματος ροζ απαλό μέχρι σκούρο κόκκινο, κοσμεί πολύ όμορφα τον κήπο ή το μπαλκόνι, την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αναπτύσσεται σε πέργκολα, σε καφασωτό, σε γλάστρα ή και σαν φράχτης. Ανάλογα το είδος, φτάνει τα 40cm ύψος όταν καλλιεργείται σε εσωτερικό χώρο και μερικά μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Χωρίς απαιτήσεις και με μικρή φροντίδα, μας ανταμοίβει με πλούσια ανθοφορία και όμορφα χρώματα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin**Καλλιέργεια**

Από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο. Επιλέξτε σημείο ηλιόλουστο ή μερική σκιά για κάποιες ποικιλίες. Αν αντικαταστήσετε παλιές τριανταφυλλιές αφαιρέσετε 40-50 cm χώματος. Σκάψτε μια τρύπα αρκετά μεγάλη, προσθέστε χώμα με κομπόστ και ένα ανόργανο λίπασμα και κατόπιν φυτέψτε την τριανταφυλλιά. Συμπληρώστε με χώμα και ποτίστε καλά.

Κλαδέψτε κάθε άνοιξη για καλύτερη και πιο αρμονική ανθοφορία.

Κατά την ανθοφορία ποτίστε τακτικά γύρω από τις ρίζες αποφεύγοντας να βρέξετε τα άνθη.

Χρησιμοποιήστε ειδικό λίπασμα για τριανταφυλλιές από το Μάιο ως τον Ιούλιο.

Το φθινόπωρο δημιουργήστε ένα μικρό ανάχωμα 15cm γύρω από τη βάση του φυτού, στο σημείο που ενώνεται το μίσχευμα με το χώμα. Μετά τις τελευταίες παγωνιές του χειμώνα αφαιρέστε το ανάχωμα.

Ασθένειες και συμπτώματα

Ψείρες στα μικρά μπουμπούκια την άνοιξη: ψεκάστε τα μπουμπούκια με ένα ειδικό εντομοκτόνο για τριαντάφυλλα στην αρχή της άνοιξης. Επαναλάβετε κάθε 3 εβδομάδες.

Γκριζωπή άσπρη σκόνη στα νεαρά φύλλα: ωίδιο που οφείλεται σε μύκητα (oidium). Χρησιμοποιήστε ειδικό μπκτοκτόνο.

Μαύρες κηλίδες που προκαλούν το κίρνισμα των φύλλων: μύκητας. Χρησιμοποιήστε ειδική θεραπεία. Αν τα φύλλα είναι κίρνωπα χωρίς μαύρες κηλίδες, πιθανή έλλειψη νερού.

Μικρές παρτοκαλί κηλίδες στο πίσω μέρος των φύλλων: σκουριά, ακίνδυνη για την τριανταφυλλιά. Χρησιμοποιήστε ειδική θεραπεία για να αποφύγετε αυτήν την αντιαισθητική όψη των φύλλων.

Στην αρχή της άνοιξης, εάν εμφανιστούν συμπτώματα ασθένειας, αφαιρέστε τα μέρη που έχουν προσβληθεί. Εφαρμόστε προληπτικά ένα ειδικό εντομοκτόνο για τριανταφυλλιές.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Το τριαντάφυλλο είναι το κατεξοχήν λουλουδί του έρωτα**Έκθεση**

Στον ήλιο ή στη σκιά, σε απάνεμο μέρος

**Λίπασμα**

Ειδικό λίπασμα για τριανταφυλλιές από το Μάιο ως τον Ιούλιο για πλούσια ανθοφορία

**Θερμοκρασία**

Τουλάχιστον 20°C για να ανθίσει την άνοιξη

**Ανθοφορία**

Από το Μάιο ως τον Σεπτέμβριο

**Νερό**

Ποτίστε στη βάση μια ή δυο φορές την εβδομάδα κατά την ανθοφορία. Μην βρέξετε τα άνθη

**Πολλαπλασιασμός**

Με μοσχεύματα 5 έως 7cm στην αρχή της άνοιξης ή με σπόρο

**Χώμα**

Πλούσιο, ουδέτερο, πυκνό με καλή αποστράγγιση

www.leroymerlin.gr


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Αεροπ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Ανθοφόρα εξωτ. χώρου

12

ΚΑΤΗΦΕΣ

Βοτανική ονομασία

Tagetes erecta

Προέλευση

Αμερική

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Φυτό εξωτερικού χώρου με χαρακτηριστικά χρωματιστά λουλούδια κίτρινα ως πορτοκαλί, που προσδίδουν όμορφη όψη στον κήπο. Μεγαλώνει γρήγορα και συνήθως φτάνει το ένα μέτρο. Η μυρωδιά των φύλλων και των λουλουδιών απωθεί τα έντομα, και έτσι το φυτό προστατεύει και άλλες καλλιέργειες.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Φυτέψτε το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, κατά προτίμηση σε ηλιόλουστο μέρος. Οι σπόροι δεν χρειάζεται να φυτευτούν βαθιά στο έδαφος.

Ποτίζετε τη βόσση του φυτού, χωρίς να βρέχετε τα φύλλα. Αποφύγετε το συχνό πότισμα για να μη σαπίσουν οι ρίζες.

Το φυτό αντέχει στο κρύο και αναπτύσσεται σε θερμά και ηλιόλουστα μέρη.

Όταν ανθίσει, κόψτε τα μαραμένα άνθη ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή σπόρων και να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα νέα άνθη.

Ασθένειες και συμπτώματα

Γενική εξασθένηση του φυτού: είναι πιθανό να έχουν σαπίσει οι ρίζες λόγω υπερβολικής ποσότητας νερού ή κακής αποστράγγισης.

Όταν καλλιεργείται σε εξωτερικό χώρο κινδυνεύει από σαλιγκάρια, γυμνοσάλιαγκες και μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε δολώματα για να καταπολεμήσετε τα σαλιγκάρια και τους γυμνοσάλιαγκες και χρησιμοποιήστε θεραπεία κατά της μελίγκρας.

Το φυτό είναι ανθεκτικό και δεν είναι επιρρεπές σε ασθένειες. Καλό είναι να μην βρέχονται τα φύλλα του, γιατί μπορεί να προσβληθεί από μύκητες φυλλώματος, όπως ωίδιο, βοτρυτή ή σκωριάσεις

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Τα όμορφα χρωματιστά
λουλούδια του απωθούν
τα έντομα και προσδίδουν
όμορφη όψη στον κήπο**

Έκθεση
Στον ήλιο

Λίπασμα
Μικρές απαιτήσεις

Θερμοκρασία
Ιδανικά 18°C

Ανθοφορία
Από το καλοκαίρι ως το φθινόπωρο

Νερό
Ποτίστε με φειδώ.
Αποφύγετε τη στασιμότητα νερού

Πολλαπλασιασμός
Με σπόρο (αναπτύσσεται σε
1-2 εβδομάδες στους 20-30°C)

Χώμα
Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, αλλά προτιμά το μέτριο, γόνιμο, ελαφρύ, δροσερό, με καλή αποστράγγιση

www.leroymerlin.gr


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

