

Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



Κωνοφόρα

01

ΕΛΑΤΟ

Βοτανική ονομασία

Picea abies

Προέλευση Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Παρουσιάζει ένα πυραμιδοειδές και λογοχειδές φύλλωμα, το οποίο αποτελείται από κλαδιά με μικρή κλίση προς τα κάτω χρώματος κοκκινωπού καφέ. Ο κορμός είναι ευθύς, ο φλοιός είναι χρώματος κοκκινωπού καφέ και ξεφλουδίζεται σε κομμάτια. Τα φύλλα, χρώματος λαμπερού πράσινου, είναι μύτερα, χωρίς να ταιμπούν, και καλύπτουν τα κλαδιά αλληλεπικαλυπτόμενα.

Οι καρποί (βάλανοι) είναι κυλινδρικοί, οβάλ, καφέ και αποτελούνται από λαμπερές και εύκαμπτες φολίδες.

Οι συμβουλές Leroy Merlin**Καλλιέργεια**

Τοποθετήστε το δέντρο σε φωτεινό και δροσερό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και ρεύματα αέρα.

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, αποφύγετε το βαρύ στολισμό, για να μην σπάσουν τα κλαδιά και μην ψεκάζετε με συνθετικό χιόνι ή πολύχρωμα σπρέι.

Διαπρέπει το χώμα υγρό, χωρίς υπερβολές, ακόμα και με τη βοήθεια ψεκαστήρα. Στο τέλος της χριστουγεννιάτικης περιόδου, αν το δέντρο που αγοράσατε έχει ρίζες, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε εξωτερικό χώρο, στο μπαλκόνι, ή να το φυτέψετε στον κήπο.

Ασθένειες και συμπτώματα

Κίτρινες φλύκταινες στις βελόνες και στους βλαστούς: σκωρίαση. Ακολουθήστε θεραπεία με μυκητοκτόνο.

Σήψη στη βάση του κορμού: σπιρριζία (μυκητολογική ασθένεια). Βελτώστε την αποστράγγιση στη βάση του φυτού και σταματήστε τα ποτίσματα. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο.

Κιτρίνισμα και πτώση των βελόνων, παρουσία αποικιών μικρών εντόμων στις κορυφές των βλαστών: μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε ένα συστηματικό εντομοκτόνο.

Καχεκτικό φυτό, παρουσία ασιπιδίων στα κλαδιά και τους βλαστούς: ψώρα. Αντιμετωπίστε με ένα ορυκτέλαιο ενεργοποιημένο με ειδικό εντομοκτόνο.

Χαρίζει πολύ χρώμα από τα μέσα του καλοκαιριού μέχρι τα πρώτα κρύα**Έκθεση**

Προσαρμόζεται τόσο στην έκθεση στον ήλιο όσο και στο ημίφως

**Λίπασμα**

Την περίοδο βλάστησης, προσθέστε λίπασμα για μπουναί στο νερό του ποτίσματος κάθε 10-15 μέρες

**Θερμοκρασία**

Ανθεκτικό φυτό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες

**Ανθοφορία**

Δεν ανθοφορεί

**Νερό**

Άφθονο πόσιμο το καλοκαίρι. Αφήστε το χώμα να στεγνώσει μεταξύ δύο διαδοχικών ποτισμάτων

**Πολλαπλασιασμός**

Με σπόρους από το Φεβρουάριο ως το Μάρτιο

**Χώμα**

Προπνήστε το όξινο έδαφος, κάποια συγγενή είδη προσαρμόζονται ακόμη και σε ασβεστώδες έδαφος

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





Κωνοφόρα

04

ΤΟΥΓΙΑ

Βοτανική ονομασία

Thuja spp.

Προέλευση Βόρεια Αμερική,
Ανατολική Ασία

Δυσκολία καλλιέργειας
Χαμηλή

Παρουσιάζει ευθύ κορμό και πυραμιδοειδές ή επίμηκες φύλλωμα, με μορφή φλόγας. Ο φλοιός έχει χρώμα καφετί-πορτοκαλί, σε φυτά ηλικίας μερικών ετών τείνει να σπάει σε φολίδες, που αφήνουν βαθιές ρωγμές στην επιφάνεια. Τα φύλλα είναι μικρά, πολύ συμπαγή, με μορφή φολίδων. Το χρώμα τους είναι σκούρο πράσινο, αν και μερικά είδη το χειμώνα γίνονται κίτρινα. Παράγει μικρές στρογγυλές βάλανους, που διαιρούνται σε επίπεδους τομείς, στο κέντρο των οποίων υπάρχει μία μυτερή προεξοχή.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Βάλτε το φυτό σε ηλιόλουστη θέση. Μπορεί να τοποθετηθεί και στη σκιά, αναπτύσσεται όμως καλύτερα με 3-4 ώρες άμεσης ηλιοφάνειας την ημέρα.

Το είδος αυτό δεν είναι κατάλληλο για παραθαλάσσιες τοποθεσίες, καθώς δεν αντέχει τον αλμυρό αέρα.

Ποτίζετε τακτικά μόνο τα νεαρά δέντρα, για τα ενήλικα δέντρα αρκεί το νερό της βροχής. Τοποθετήστε το σε πλούσιο, μαλακό, βαθύ χώμα με πολύ καλή αποστράγγιση.

Ασθένειες και συμπτώματα

Προοδευτικό κίτρινομα και πτώση των φύλλων, παρουσία σήψης στη ρίζα: σήψη του λαιμού (μυκητολογική ασθένεια). Καλή αποστράγγιση του χώματος, όχι ποτίσματα, χορηγήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Κιτρινωπές κηλίδες στα κλαδιά και σε μέρος του φυλλώματος, που γίνονται καφετί και προκαλούν πλήρη φυλλόπτωση. Καρκίνος και ανθράκωση των κλαδιών. Αφαιρέστε τα προσβεβλημένα μέρη που αποτελούν εστίες για μελλοντικές προσβολές και, σε περίπτωση βαριάς προσβολής, αντιμετωπίστε με μυκητοκτόνα με βάση το χαλκό.

Κιρίνιασμα και ξήρανση της βλάστησης των κορυφών των κλαδιών, παρουσία αποικιών μικρών εντόμων: μελίγκρα της τούγιας. Σε περίπτωση βαριάς προσβολής, ακολουθήστε θεραπεία με ειδικό εντομοκτόνο.

Παρουσία κίτρινωπών φλυκταινών σε φύ-

λα και κλαδιά: σκωρίαση (μυκητολογική ασθένεια). Σε περίπτωση βαριάς προσβολής, ακολουθήστε θεραπεία με ειδικό μυκητοκτόνο.

Παρουσία σακχαρωδών ουσιών στα κλαδιά (μελάσα) και αποικιών μικρών ασιπιδιών που εκκρίνουν μία κηρώδη και βαμβακώδη ουσία: βαμβακώδης ψώρα. Αφαιρέστε τις αποικίες εντόμων και σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, χρησιμοποιήστε ένα ορυκτέλαιο, ενεργοποιημένο με ειδικό εντομοκτόνο.

Χρησιμοποιήστε φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε περίπτωση δένδρων μικρών διαστάσεων. Για μεγαλύτερα απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Φυτό με εύκολη καλλιέργεια, ιδανικό για κήπους, τόσο μεμονωμένα όσο και για τη δημιουργία φρακτών



Έκθεση
Άμεση ηλιακή ακτινοβολία



Λίπασμα
Οργανική ουσία κατά τη φύτευση και πλήρες λίπασμα για φυτά από γλάστρα. Διακοπή τον Αύγουστο, για ξυλοποίηση του φυτού



Θερμοκρασία
Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες



Ανθοφορία
Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου



Νερό
Το πόσιμα απαιτείται για τα νεαρά φυτά και σε περιόδους ξηρασίας



Πολλαπλασιασμός
Το Φεβρουάριο με τη μέθοδο της σποράς και με μόσχευμα το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο



Χώμα
Από τύρφη και άμμο σε ίσες αναλογίες. Συνιστούμε βαθιά και υγρά εδάφη, με καλή αποστράγγιση

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



Κωνοφόρα

05

Γ Κ Ο Λ Α Ν Τ Κ Ρ Ε Σ Τ

Βοτανική ονομασία

Cupressus macrocarpa

Προέλευση Αμερική,

λεκάνη της Μεσογείου

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Έχει όμορφο πράσινο φύλλωμα με κίτρινες πινελιές στα άκρα. Συνήθως χρησιμοποιείται ως φράχτης ή προστασία από τον άνεμο. Μπορεί επίσης να διακοσμήσει τον κήπο μας, φτάνοντας τα 20 μέτρα ύψος στο τέλος της ανάπτυξής του. Το κυπαρίσσι ταιριάζει απόλυτα στο μεσογειακό κλίμα και καλλιεργείται εύκολα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin**Καλλιέργεια**

Φυτέψτε το φθινόπωρο, σε οποιοδήποτε τύπο χώματος με καλή αποστράγγιση σε φωτεινό σημείο.

Την περίοδο ανάπτυξής του (άνοιξη - καλοκαίρι), ποτίστε τακτικά το κάτω μέρος του δέντρου με καλή αποστράγγιση μέχρι το επόμενο πότισμα.

Προσθέστε λίπασμα μια φορά το μήνα όταν αναπτύσσεται το δέντρο.

Την άνοιξη, το αρσενικό φυτό παράγει γύρη η οποία διασκορπίζεται στον αέρα. Οι σπόροι εμφανίζονται την άνοιξη στα θηλυκά φυτά και μοιάζουν με ανομοιόμορφες μπάλες.

Ασθένειες και συμπτώματα

Ξερά κλαδιά χωρίς ρετίνι: πιθανή παρουσία παράσιτων (προνύμφες ή άλλα έντομα). Χρησιμοποιήστε εντομοκτόνο.

Ξερά κλαδιά με ρετίνι: προσβολή από σοβαρή μυκητίαση που οφείλεται στο Cypress Canker. Κόψτε τα προσβεβλημένα κλαδιά. Δυστυχώς η ασθένεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με κανένα τύπο εντομοκτόνου.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προτιμών για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επκέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

**Όμορφο πράσινο φύλλωμα,
ιδανικό για κήπους,
και για τη δημιουργία φρακτών****Έκθεση**

Στον ήλιο ή σε μερική σκιά

**Λίπασμα**

Μία φορά τον μήνα την άνοιξη και το καλοκαίρι

**Θερμοκρασία**

Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ιδανικά 18 ως 24°C για να ανθοφορήσει την άνοιξη

**Ανθοφορία**

Την άνοιξη και το καλοκαίρι

**Νερό**

Το πότισμα απαιτείται για τα νεαρά φυτά και σε περιόδους ξηρασίας

**Πολλαπλασιασμός**

Με σπόρους, μοσχεύματα ή καταβολάδες

**Χώμα**

Μικρές απαιτήσεις, ευδοκμεί σε όλους τους τύπους χώματος, καλή αποστράγγιση

www.leroymerlin.gr

Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

