

# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Οπωροφόρα

01

## ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

### Βοτανική ονομασία

Citrus sinensis

### Προέλευση

Βόρεια Κίνα, Βιετνάμ, Ινδία

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλές δένδρο ή θάμνος με οβάλ φύλλα, μυτερά στα άκρα, τα οποία διαθέτουν μεγάλα νεύρα στο κοτσάνι. Έχουν έντονο πράσινο χρώμα και σχηματίζουν συμπαγές και στρογγυλό φύλλωμα. Η πορτοκαλιά έχει ευθύ και καμραυτό κορμό, τα πιο ισχυρά κλαδιά έχουν πολλά αγκάθια. Έχει όμορφα και εύοσμα λευκά άνθη, με πέντε πέταλα, μεμονωμένα ή, συχνότερα, ενωμένα κατά ομάδες στα άκρα των κλαδιών. Είναι ελαφρά βελουτέ και γνωστά και με την ονομασία πορτοκαλανθοί (τα άνθη της νύφης).

### Οι συμβουλές Leroy Merlin

#### Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε θέση προστατευμένη από τα ρεύματα και τις ριπές κρύου αέρα, επειδή οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι δυνατό να προκαλέσουν την πτώση των μπροσπινών φύλλων.

Μην βρέχετε τον κορμό και μην αφήνετε να στεγνώσει το έδαφος ανάμεσα στα ποτίσματα, αφαιρώντας το νερό από το πιάτο της γλάστρας, για να αποφύγετε τη στασιμότητα του νερού.

Αφαιρέστε τα κτρινωμένα φύλλα και γυαλίστε τα υπόλοιπα με ένα πανί.

Μεταφυτεύστε μία φορά το χρόνο στα μέσα Μαρτίου, επιλέγοντας μία γλάστρα μεγαλύτερη από την προηγούμενη.

#### Ασθένειες και συμπτώματα

Μαραμένα φύλλα: πλεόνασμα ή έλλειψη νερού. Ποτίστε σωστά και διατηρείτε πάντοτε καλή αποστράγγιση του εδάφους.

Μικρά ασπίδια στα κλαδιά, τα φύλλα και τους καρπούς: ψώρα. Κλαδέψτε για καλή κυκλοφορία του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό του φυτού, περιορίζοντας την προσκόλληση της ψώρας. Σε περίπτωση σοβαρής μόλυνσης, αντιμετωπίστε με παραφινέλαιο αναμιγμένο με ειδικό εντομοκτόνο.

Ζαρωμένες άκρες των φύλλων και μίσχοι, παρουσία αποικιών μικρών μαύρων ή πράσινων εντόμων: μελίγκρα. Εφαρμόστε ένα ειδικό εντομοκτόνο, καλύτερα συστηματικό.

Φύλλα με μαύρες κηλίδες: καπνιά, μύκητες που αναπτύσσονται στα σακχαρώδη υπολείμματα (μελάσα) που εκλύει η μελίγκρα ή η ψώρα. Χρησιμοποιήστε υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη μαύρη σκόνη από τα φύλλα και προϊόντα με βάση το χαλκό για να περιορίσετε τη διάδο-

ση. Υιοθετήστε μία αντιμετώπιση με βάση συστηματικά εντομοκτόνα για τη μελίγκρα και με βάση την υγρή παραφίνη για την ψώρα.

Οφιοειδείς σήραγγες στα φύλλα: οφιοειδής φυλλορύκτης των εσπεριδοειδών. Αντιμετωπίστε με ειδικά συστηματικά εντομοκτόνα για τη μελίγκρα και την ψώρα.

Κτρινωπές κηλίδες στους καρπούς, που σιγά-σιγά χαλάνε: μύγα των καρπών, αντιμετωπίστε με ειδικό εντομοκτόνο.

Έκλυση κομμοειδών εξιδρωμάτων στη βάση του κορμού: κομμώσιων εσπεριδοειδών (μυκητολογική ασθένεια). Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό μυκητοκτόνο για θεραπεία του λαιμού.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προιόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προιόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δόσολογία χρήσης του προιόντος.

### Καλλωπιστικό φυτό που ανέκαθεν θεωρείται ότι φέρνει τύχη



#### Έκθεση

Σε πολύ φως, αντέχει την άμεση έκθεση στον ήλιο



#### Θερμοκρασία

Από 13°C ως 30°C. Κατάλληλα τα ζεστά και υγρά κλίματα με ήπιους χειμώνες χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας



#### Νερό

Ποτίζετε νωρίς το πρωί και το απόγευμα με βρόχινο νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20°C)



#### Χώμα

Χώμα γενικής χρήσης ή ειδικό για εσπεριδοειδή



#### Λίπασμα

Την άνοιξη αναμίξτε ένα ειδικό οργανικό λίπασμα για εσπεριδοειδή στην ανώτερη στρώση του χώματος



#### Ανθοφορία

Την άνοιξη. Οι καρποί θα ωριμάσουν το φθινόπωρο ή τον επόμενο χειμώνα



#### Πολλαπλασιασμός

Με σπορά το Μάρτιο, με ακραίο μόντευμα το καλοκαίρι

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Οπωροφόρα

03

Λ Ε Μ Ο Ν Ι Α

**Βοτανική ονομασία**

Citrus limon

**Προέλευση**

Ινδοκίνα και Ινδία

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Μικρό αειθαλές δέντρο με οβάλ-λογοχειδή λαμπερά φύλλα με σκούρο πράσινο χρώμα. Τα άνθη εμφανίζονται ανάμικτα με τα φύλλα όλο το έτος, υπό τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι λευκά με μοβ αποχρώσεις και έντονο άρωμα. Τα φρούτα, οβάλ και μυτερά στο άκρο, έχουν λείο ή τραχύ φλοιό με χρώμα από πράσινο ως κίτρινο, πλούσια σε αιθέρια έλαια. Η σάρκα διαιρείται σε κομμάτια και ο χυμός είναι όξινος.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

**Καλλιέργεια**

Την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι φυτέψτε τα νεαρά φυτά, πραγματοποιήστε τη μεταφύτευση και τη σπορά, βάλτε λίπασμα και αυξήστε την ποσότητα νερού στο πότισμα.

Αντίθετα, την περίοδο φθινόπωρο-χειμώνας, όταν η θερμοκρασία πέφτει, βάλτε τις γλάστρες σε χώρους με καλό φωτισμό, όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ κάτω από τους 7°C.

Η λεμονιά αντέχει και σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά για σύντομες περιόδους. Μειώστε σταδιακά το πότισμα, διατηρώντας μικρές τις ποσότητες νερού.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Μαραμένα φύλλα: πλεόνασμα ή έλλειψη νερού. Ποτίστε σωστά και διατηρείτε πάντοτε καλή αποστράγγιση του εδάφους.

Παρουσία μικρών ασιδίων στα κλαδιά, τα φύλλα και τους καρπούς: ψώρα. Κλαδέψτε, η καλή κυκλοφορία του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό του φυτού περιορίζει την προσκόλληση της ψώρας. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, αντιμετωπίστε με υγρή παραφίνη, καλύτερα αν αναμιχθεί με ειδικά εντομοκτόνα.

Ζαρωμένες άκρες των φύλλων και μίσχοι, παρουσία αποικιών μικρών μαύρων ή πράσινων εντόμων: μελίγκρα. Εφαρμόστε ένα ειδικό εντομοκτόνο, καλύτερα συστηματικό.

Φύλλα διάσπικτα από μαύρο χνούδι: καπνιά, μύκητες που αναπτύσσονται στα σακχαρώδη υπολείμματα (μελάσα) που εκλύει η μελίγκρα ή η ψώρα. Με υγρό πανί αφαιρέστε τη μαύρη σκόνη από τα φύλλα, χρησιμοποιήστε προϊόντα με βάση το χαλκό για να περιορίσετε τη διάδο-

ση. Υιοθετήστε μια αντιμετώπιση με βάση τα συστηματικά εντομοκτόνα για τη μελίγκρα και με βάση την υγρή παραφίνη για την ψώρα.

Παρουσία οφιοειδών σπράγγων στα φύλλα: οφιοειδής φυλλορύκτης των εσπεριδοειδών. Αντιμετωπίστε με ειδικά συστηματικά εντομοκτόνα που περιορίζουν και τη μελίγκρα και την ψώρα.

Παρουσία κίτρινων κηλίδων στους καρπούς, σάπισμα καρπών: μύγα των καρπών, αντιμετωπίστε με ειδικό εντομοκτόνο.

Έκλυση κομμοειδών εξιδρωμάτων στη βάση του κορμού: κομμώωση των εσπεριδοειδών (μυκητολογική ασθένεια). Χρησιμοποιήστε ειδικό μυκητοκτόνο για θεραπεία στο λαιμό ή στο έδαφος.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Κατάλληλο για καλλιέργεια σε γλάστρα, άνθη με έντονο και ευχάριστο άρωμα**



**Έκθεση**  
Στον ήλιο ή σε μερική σκιά



**Λίπασμα**  
Την άνοιξη αναμίξτε ένα ειδικό οργανικό λίπασμα για εσπεριδοειδή στην ανώτερη στρώση του χώματος



**Θερμοκρασία**  
Ελάχιστη: 7°C



**Ανθοφορία**  
Όλο το έτος



**Νερό**  
Συχνά ποτίσματα την άνοιξη και το καλοκαίρι. Υποφέρει από σταισιμότητα νερού



**Πολλαπλασιασμός**  
Με σπορά το Μάρτιο.  
Με ακραίο μόσχευμα το καλοκαίρι



**Χώμα**  
Ελαφρύ, πλούσιο σε οργανικές ουσίες, με καλή αποστράγγιση

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Οπωροφόρα

06

Ε Λ Ι Α

**Βοτανική ονομασία**

Olea europaea

**Προέλευση**

Λεκάνη της Μεσογείου

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Έχει μακριά λοχοειδή φύλλα με μέσο μήκος 5-8cm, πράσινα στην επάνω όψη και γκρι-ασμή στην κάτω όψη, με μέση διάρκεια ζωής γύρω στα 3 έτη. Ο καρμός έχει όψη γκρι-πράσινη και είναι λείος μέχρι περίπου το δέκατο έτος, κατόπιν αποκτά ρόζους, γίνεται τραχύς και στρεβλός με βαθιά αυλάκια και παίρνει σκούρο χρώμα, σχεδόν μαύρο. Το ριζικό σύστημα γίνεται περίπλοκο με πολλές επιφανειακές διακλαδώσεις, επιτελούν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας απορρόφησης θρεπτικών ουσιών.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

**Καλλιέργεια**

Τοποθετήστε το φυτό σε φωτεινές περιοχές, προστατευμένες από τα ρεύματα αέρα και από τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Υπενθυμίζουμε ότι η ελιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο κρύο και διατρέχει κίνδυνο από την έκθεση σε απρόβλεπτους παγετούς.

Ποτίζετε με φειδώ, αυξάνοντας το πότισμα την άνοιξη.

Αφαιρείτε τα ξηρά και προσβεβλημένα μέρη. Πραγματοποιήστε τη μεταφύτευση την άνοιξη, μόνο αν η γλάστρα είναι πια πολύ μικρή σε σχέση με τις διαστάσεις των ριζών

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Στρογγυλόμορφα στίγματα 10mm, που αποτελούνται από ομόκεντρους πολύχρωμους κύκλους (από κίτρινο μέχρι καφετί): κυκλοκόνιο ή μάπι του παγωνιού (μυκητολογική ασθένεια). Αντιμετωπίζεται με προϊόντα με βάση το χαλκό.

Παρουσία κονδυλωδών εκκρίσεων στα κλαδιά, τα φύλλα και τις ρίζες: ψώρα της ελιάς (βακτηριακή ασθένεια). Προληπτική καταπολέμηση: κλάδεμα πλαγίων βλαστών και καταστροφή των άρρωστων κλαδιών, προστασία και αποκατάσταση των βλαβών με χαλκούχα μυκητοκτόνα. Ιδιαίτερη προσοχή κατά το κλάδεμα με κατάλληλα απολυμασμένα ψαλίδια κλαδέματος, για να αποφευχθεί η μετάδοση του βακτηρίου από ένα άρρωστο φυτό σε ένα υγιές.

Μικρά μαύρα ασπίδια, που σχηματίζουν διπλό σταυρό στο πίσω μέρος φύλλων και κλαδιών: ψώρα. Αντιμετωπίστε με υγρή παραφίνη, καλύτερα αν αναμιχθεί με ειδικό εντομοκτόνο.

Καρποί που παρουσιάζουν μικρές τρύπες και κατόπιν ρυτιδιάζουν: δάκος της ελιάς, αντιμετωπίστε με ειδικά εντομοκτόνα κατά του δάκου.

Φύλλα με κυκλικές ρωγμές: ωπύρρυγχος. Τοποθετήστε ένα προστατευτικό από υαλοβάμβακα στη βάση του κορμού, για να μην επιτρέψετε στο έντομο να ανεβεί. Σε περίπτωση βαριάς προσβολής, αντιμετωπίστε με εντομοκτόνο.

Παρουσία σπράγγων στα φύλλα, στα φυλλοφόρα μπουμπούκια και στους καρπούς: κάμψια της ελιάς. Αντιμετωπίστε με ειδικό εντομοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προιόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προιόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Μακρόβιο φυτό, με δυνατότητα αναγέννησης μεγάλου μέρους του επίγειου και υπόγειου συστήματός του**



**Έκθεση**  
Τοποθετήστε σε ηλιόλουστους και προστατευμένους χώρους



**Λίπασμα**  
Χρησιμοποιήστε λίπασμα που παρέχει άζωτο, φωσφόρο και κάλιο



**Θερμοκρασία**  
Μέση, χωρίς απότομες μεταβολές



**Ανθοφορία**  
Αρχές Απριλίου με την εμφάνιση της αποκαλούμενης ανθοφορίας της ελιάς



**Νερό**  
Αντοχή σε ξηρό περιβάλλον, αλλά την άνοιξη χρειάζεται επιπλέον πότισμα



**Πολλαπλασιασμός**  
Με σπόρους και με μέρη του φυτού (μπουμπούκια, παραβλαστήματα και μοσχεύματα)



**Χώμα**  
Υπόστρωμα μέσης γονιμότητας, μικρού βάθους, ασβεστώδες ή pH ασιατικό

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

