

Έντυπα
καλλιέργειας
Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλυμυ 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 01 ΔΙΕΦΕΝΜΠΑΧΙΑ

Βοτανική ονομασία

Dieffenbachia spp.

Προέλευση

Νότια και Κεντρική Αμερική

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Το φυτό αποτελείται από έναν μόνο μίσχο, παρόμοιο με κορμό, με έναν ακραίο θύσανο φύλλων. Το ύψος της Διεφενμπάχιας μπορεί να κυμαίνεται από 20 cm ως 1,50 m, ανάλογα με το είδος. Τα φύλλα έχουν ωοειδές σχήμα και μεγάλες διαστάσεις (σε ορισμένα είδη, τα ενήλικα φύλλα έχουν μήκος που φτάνει τα 60 cm), το χρώμα τους είναι έντονο πράσινο με εμφανείς ρίγες με χρώμα που ποικίλλει, από το λευκό-βουάρ ως το κίτρινο.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε θέση προστατευμένη από τα ρεύματα και τις ριπές κρύου αέρα, επειδή οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι δυνατό να προκαλέσουν την πτώση των μπροσπινών φύλλων.

Αποφύγετε να βρέχετε τον κορμό και μην ξεχνάτε να την αφήνετε να στεγνώνει από το ένα πότισμα ως το επόμενο, αφαιρώντας το νερό από το πιάτο της γλάστρας, για να αποφύγετε τη στασιμότητα νερού.

Αφαιρέστε τα κτρινωμένα φύλλα και γυαλίστε τα άλλα φύλλα με ένα πανί.

Μεταφυτεύστε μία φορά το χρόνο στα μέσα Μαρτίου, επιλέγοντας μία γλάστρα μεγαλύτερη από την προηγούμενη.

Ασθένειες και συμπτώματα

Μαραμένα φύλλα: πλεόνασμα ή έλλειψη νερού. Διατηρείτε την υγρασία του χώματος σε βέλτιστο επίπεδο.

Σταδιακό κτρινίσμα των φύλλων και τσαλάκωμα: υπερβολικό φως ή ψύχος. Εξαλείφονται διατηρώντας το φυτό στο φυσικό του περιβάλλον.

Φθορά του φυτού και κτρινίσμα των φύλλων, ύπαρξη αποικιών ασιπιδίων: ψώρα. Αφαιρέστε τις αποικίες εντόμων με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη και, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, ακολουθήστε αγωγή με ένα ορκετκίλιο ενεργοποιημένο με εντομοκτόνο.

Ύπαρξη αποικιών μικρών εντόμων στην κάτω επιφάνεια των φύλλων: μελίγκρα. Ακολουθήστε αγωγή με ειδικό συστηματικό εντομοκτόνο. Μειώστε τα λιπάσματα.

Ύπαρξη μεγάλων καφετί-κιτρινωπών εγκοπών στην επιφάνεια των φύλλων, τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται: ανθράκωση (μυκητολογική ασθένεια). Αποφύγετε υπερβολές υγρασίας και ευνοήστε τον καλό αερισμό, εξαλείψτε τα φύλλα που παρουσιάζουν συμπτώματα και, για να αποφύγετε νέες προσβολές, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Καλλωπιστικό, με εύκολη καλλιέργεια και αυξημένη μακροζωία, ιδανικό για εσωτερικό χώρο



Έκθεση

Καλό φως χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο. Τοποθετήστε το 2 m από την πηγή φωτός



Θερμοκρασία

Σταθερή και γύρω στους 22°C το καλοκαίρι και τους 18°C το χειμώνα



Νερό

Βρέχετε συχνά το καλοκαίρι και σπανιότερα το χειμώνα, με νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος



Χώμα

Ινώδης τύρφη και χώμα από φύλλα. Το χώμα πρέπει να είναι πλούσιο σε χώμους, τύρφη και άμμο σε ίσα μέρη



Λίπασμα

Χορηγήστε λίπασμα μία φορά το μήνα το καλοκαίρι



Ανθοφορία

Δεν αποτελεί το διακοσμικό στοιχείο της διεφενμπάχιας και αφαιρείται



Πολλαπλασιασμός

Με ακραία μοσχεύματα ή καταβολάδες κεφαλής

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Νεώρ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου

02

ΓΙΟΥΚΑ

Βοτανική ονομασία

Yucca spp.

Προέλευση

Κεντρική Αμερική

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αποτελείται από έναν ξυλώδη καρμό, εύρωστο, κυλινδρικό, δενδρώδη, με λίγες διακλαδώσεις, από όπου ξεπροβάλλουν μυτερά και ευθεία πράσινα φύλλα, χωρίς αγκάθια, σκληρά και όρθια, που συνενώνονται σε ροζέτες. Καλλιεργείται και σε μορφές όπου τα φύλλα προβάλλουν απευθείας από το χώμα. Τα άνθη ανοίγουν από τον Αύγουστο ως το Σεπτέμβριο, αλλά δεν είναι σπάνιες και οι πιο όψιμες ανθοφορίες. Είναι αιωρούμενα, συνενωμένα σε μορφή καμπάνας, λευκά-βουάρ και εύοσμα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε χώρο που δεν υπάρχουν ρεύματα αέρα ή απότομες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Από τον Απρίλιο ως το Σεπτέμβριο, η Γιούκα μπορεί να εκτίθεται σε εξωτερικό χώρο στο φως.

Ποτίστε γενναιάδωρα το καλοκαίρι, προσέχοντας να μην το παρακάνετε, ενώ μειώστε τα ποτίσματα με την έλευση του χειμώνα.

Αποφύγετε τα στάσιμα νερά, επειδή ο κορμός μπορεί να σαπίσει.

Διαπρέψτε την αυξημένη υγρασία γύρω από το εναέριο μέρος του φυτού και αποστραγγίστε καλά το χώμα.

Ασθένειες και συμπτώματα

Κίτριναμένα φύλλα: έλλειψη φωτός. Τοποθετήστε το φυτό σε φωτεινή θέση.

Κίτριναμένα φύλλα και ξερά κατά μέρη, παρουσία αποικιών ασιπιδίων, κυρίως στο κάτω μέρος των φύλλων: ψώρα. Αφαιρείται με το χέρι, με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη ή με θεραπείες με ορυκτέλαιο ενεργοποιημένο με εντομοκτόνο.

Ύπαρξη ελλειπτικών κηλίδων καφετί χρώματος, διατεταγμένων στην κατεύθυνση των νεύρων, οι οποίες παρουσιάζουν στο κέντρο τους μικρά μαύρα στίγματα: κηλίδωση των φύλλων της γιούκας (μυκητολογική ασθένεια). Αφαιρέστε και καταστρέψτε τα φύλλα που παρουσιάζουν συμπτώματα και προληπτικά κορηγήστε θεραπεία με μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Μυτερές αποχρωματισμένες κηλίδες και ύπαρξη μικρών αραχνών στο κάτω μέρος των

φύλλων: ακάρεα. Ακολουθήστε αγωγή με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Καφετί χρώμα και σήψη στη βάση του φυτού (κορμός): βακτηριακή σήψη. Αποφύγετε τη στασιμότητα του νερού, διαπρέψτε πάντοτε καλή αποστράγγιση του χώματος, προσέξτε, κατά τις καλλιεργητικές φροντίδες, να μην προκαλέσετε τραυματισμούς στο μέρος της βάσης του φυτού και, σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό, για να το απολυμάνετε.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Ανθεκτικό φυτό με εύκολη καλλιέργεια, κατάλληλο για φύτευση και στον κήπο



Έκθεση

Σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, προτιμά την έκθεση στο φως



Θερμοκρασία

Το καλοκαίρι αντέχει καλά μέχρι τους 28°C. Το χειμώνα, η ιδανική θερμοκρασία είναι 12°C - 15°C



Νερό

Ποτίζετε με φειδώ από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο, προσέχοντας να μην υπάρχει στάσιμο νερό στο πιάτο της γλάστρας



Χώμα

Ελαφρύ με μίγμα 7 μερών ηφαιστειακού εδάφους ή ελαφρόπετρας, 3 μερών τύρφης και 2 μερών χονδρόκοκκης άμμου



Λίπασμα

Περίπου κάθε 15-20 ημέρες, από το Μάρτιο ως τον Οκτώβριο, με υγρό λίπασμα ειδικό για πράσινα φυτά εσωτερικού χώρου



Ανθοφορία

Σε γλάστρα ανθίζει πολύ σπάνια. Οι ανθοφορίες είναι πιο συχνές αν καλλιεργείται στη γη. Παράγει λευκά άνθη με μορφή καμπάνας



Πολλαπλασιασμός

Με μοσχεύματα τμημάτων κορμού, διάτρηση των βασικών παραβλαστικών ή με σπορά σε γλάστρες και μετέπειτα μεταφύτευση

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Αεροφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14222 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 03 ΣΑΝΣΕΒΙΕΡΙΑ

Βοτανική ονομασία

Sansevieria spp.

Προέλευση

Τροπική Αφρική

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Ποώδες πολυετές φυτό με ριζωματώδεις ρίζες, παρουσιάζει φύλλα διατεταγμένα σε ροζέτα, συμπαγή και ινώδη, λοχχειδούς, μάλλον επιμήκους και κυλινδρικής μορφής. Το χρώμα των φύλλων είναι έντονο πράσινο με ανοιχτόχρωμους χρωματισμούς ή σκούρο πράσινο με πλαινές ανοιχτόχρωμες λωρίδες. Τα άνθη, μικροσκοπικά, συγκεντρώνονται σε ταξιανθία με στάχυ χρώματος λευκού-πρασινωπού και αναδίνουν ευχάριστο άρωμα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε φωτεινό περιβάλλον, όχι όμως σε άμεση έκθεση στον ήλιο, και σε προστατευμένη θέση από τα ρεύματα ή από τις ριπές κρύου αέρα.

Το χώμα διατηρείται ελαφρώς υγρό. Δεν έχει ανάγκη από πολύ πότισμα, επειδή η ρίζα έχει την τάση να σαπίζει.

Κάθε 3-4 εβδομάδες προσθέστε ένα υγρό λίπασμα.

Ποτίζετε με φειδώ, περίπου μία φορά το μήνα.

Μην ψεκάζετε νερό επάνω στα φύλλα. Καθαρίστε τα φύλλα χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί και αποφύγετε τη χρήση γυαλιστικών φύλλων.

Ασθένειες και συμπτώματα

Σήψεις του λαιμού, των ριζών και των φύλλων: Φουζαρίωση της Σανσεβιέριας. Αποφύγετε το υπερβολικό πότισμα και διατηρήστε σε άριστο επίπεδο την αποστράγγιση του χώματος ή της γλάστρας. Αφαιρέστε τα φυτά ή τα μέρη του φυτού που παρουσιάζουν συμπτώματα, για να μειώσετε την πιθανότητα μετάδοσης. Μόλις εκδηλωθούν τα πρώιμα συμπτώματα, χορηγήστε ειδικό μυκητοκτόνο στο έδαφος.

Λευκά κηρώδη ασπίδια, τα οποία παράγουν μεγάλες λευκές νιφάδες, που κάνουν το φυτό κολλώδες, συνήθως κοντά στον κορμό και στα πιο νεαρά φύλλα: λεπιειδής ή βαμβακώδης ψώρα. Αντιμετωπίζεται με τη χρήση υγρής παραφίνης σε συνδυασμό με ειδικό εντομοκτόνο.

Υπαρξη νεκρωτικών κηλίδων καφετί χρώματος, οι οποίες περιβάλλονται από ένα στεφάνι πιο σκούρου χρώματος: Ανθράκωση και κηλίωση των φύλλων της Σανσεβιέριας. Με την εμφάνιση των πρώιμων συμπτωμάτων, χρησιμοποιήστε μία αγωγή με ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Από τα πιο ανθεκτικά φυτά εσωτερικού χώρου με εύκολη φροντίδα και καλλιέργεια



Έκθεση

Προτιμά θέσεις με πολύ φως στο σπίτι, όπου μπορεί να παράγει πολύ όμορφα και χρωματιστά φύλλα



Λίπασμα

Χρησιμοποιείτε ένα υγρό λίπασμα μία φορά το μήνα



Θερμοκρασία

Ποτέ κάτω από 15-18°C. Υποφέρει από το κρύο



Ανθοφορία

Το φθινόπωρο ή το χειμώνα, ανάλογα με το περιβάλλον όπου καλλιεργείται το φυτό



Νερό

Δεν έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό: πρέπει να διατηρείτε το χώμα ελαφρώς υγρό το καλοκαίρι



Πολλαπλασιασμός

Ανάλογα με το είδος, μέσω φύλλων ή κομματιών των ριζών



Χώμα

Ελαφρύ, αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από χώμα με τύρφη και άμμο σε ίσα μέρη

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα Καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Αεροπ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14122 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 04 ΚΡΟΤΩΝΑΣ

Βοτανική ονομασία

Codiaeum spp.

Προέλευση Μαλαισία και νήσοι του Ειρηνικού

Δυσκολία καλλιέργειας Μεσαία-υψηλή

Γένος που περιλαμβάνει περίπου 15 αειθαλείς θάμνους, που χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο ή σε εσωτερικό χώρο. Στη γλώσσα των φυτών, κρότωνας σημαίνει: χαριτωμένος. Το χαρακτηριστικό φύλλωμά του είναι όντως πολύ χαριτωμένο, με τα χρώματα και τις αποχρώσεις του. Τα πιο νεαρά φύλλα είναι πράσινα με αποχρώσεις έντονου κίτρινου, ενώ τα μεγαλύτερα σε ηλικία τείνουν προς το κεραμιδι και πορτοκαλί χρώμα, φτάνοντας μέχρι τις διάφορες αποχρώσεις του κόκκινου.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Η διατήρηση του κρότωνα στο σπίτι είναι αρκετά δύσκολη, αλλά με μικρά τεχνάσματα είναι δυνατό να παραταθεί η διάρκεια ζωής του κατά πολύ.

Τοποθετήστε το φυτό σε ηλιόλουστες θέσεις, αλλά προστατευμένες, καθώς είναι ευαίσθητο στα ρεύματα αέρα.

Η θερμοκρασία πρέπει να είναι διαρκώς ήπια. Ο αέρας δεν πρέπει να είναι ποτέ ξηρός.

Αν το περιβάλλον υπερθερμαίνεται, καλό είναι να βρέχετε τακτικά το φύλλωμα, το οποίο πρέπει να διαπρέϊται πεντακάθαρο.

Μικρά και συχνά ποτίσματα, πάντα με χλιαρό νερό, προσπαθώντας να υγραίνετε απλώς το χώμα. Το στάσιμο νερό θα προκαλέσει σπηφριζία.

Ασθένειες και συμπτώματα

Υπαρξη λευκών ή καφετί πλακών επάνω στο φύλλωμα: ψώρα. Αφαιρείται με το χέρι, με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο σε μετουσιωμένη αλκοόλη ή με θεραπείες με βάση ορυκτέλαιο ενεργοποιημένο με εντομοκτόνο.

Κηλίδες και αράχνες στο κάτω μέρος των φύλλων: κόκκινος τετράνυχος. Αντιμετωπίστε με υγρή παραφίνη ή με ειδικό ακαρεοκτόνο, βρέχοντας καλά όλο το φύλλωμα.

Μαραμένα φύλλα ή ξερά άκρα, ύπαρξη αποικιών μικρών εντόμων σε φύλλα και άνθη: ύπαρξη μελίγκρας. Αντιμετωπίστε με κατάλληλα εντομοκτόνα και αποφύγετε, για να προλάβετε την εμφάνιση, τις υπερβολές με τα λιπάσματα.

Υπαρξη μεγάλων καφετί-κτρινωπών εγκοπών στην επιφάνεια των φύλλων, τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται. Ανθράκωση (μυκητολογική ασθένεια). Αποφύγετε υπερβολές υγρασίας και ευνοήστε τον καλό αερισμό, εξαλείψτε τα φύλλα που παρουσιάζουν συμπτώματα και, για να αποφύγετε νέες προσβολές, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Ωραίο καλλωπιστικό φυτό με πρωτότυπο και χρωματιστό φύλλωμα



Έκθεση
Τοποθετήστε σε πολύ φωτεινή θέση




Λίπασμα
Χορηγείτε κάθε 3 εβδομάδες μία μικρή δόση λιπάσματος



Θερμοκρασία
Προτιμά το ήπιο κλίμα, ούτε πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύο



Ανθοφορία
Δεν ανθοφορεί



Νερό
Συχνά ποτίσματα με λίγο νερό. Χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό



Πολλαπλασιασμός
Μοσχεύματα ή καταβολάδες



Χώμα
Δεν απαιτεί ειδικούς τύπους χώματος, το σημαντικό είναι το υπόστρωμα να έχει καλή αποστράγγιση

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα
καλλιέργειας
Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14122 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 05 ΔΡΑΚΑΙΝΑ

Βοτανική ονομασία

Dracaena spp.

Προέλευση Αφρική, Κεντρική Αμερική, Κανάριες Νήσοι

Δυσκολία καλλιέργειας
Χαμηλή

Γένος που περιλαμβάνει πάνω από 40 θαμνώδη είδη, σειθαλή, με ευρεία χρήση για καλλωπιστικούς λόγους. Το φυτό αποτελείται από ένα μίσχο, μαλακό και κομψό, ανοικτού χρώματος, με έναν πλούσιο ακραίο θύσανο φύλλων. Συχνά 2-3 φυτά διαφορετικού ύψους συνενώνονται στην ίδια γλάστρα, δημιουργώντας το οπτικό εφέ των διαδοχικών επιπέδων. Τα φύλλα έχουν οβάλ ή επιμήκη μορφή και είναι μυτερά, το χρώμα ποικίλλει από το έντονο ως το σκούρο πράσινο με ρίγες κρεμ ή σε αποχρώσεις του κόκκινου.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό μακριά από τα καλοριφέρ, για να αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα και τη μειωμένη υγρασία της ατμόσφαιρας και βάλτε το σε θέση προστατευμένη από τα ρεύματα κρύου αέρα.

Αποφύγετε να αφήνετε να στεγνώσει το επιφανειακό χώμα ανάμεσα στα ποτίσματα και

αφαιρείτε το νερό από το πιάτο της γλάστρας, για να αποφύγετε τη στασιμότητα νερού. Αν χρησιμοποιείτε το πιάτο της γλάστρας, τοποθετήστε στον πάτο της γλάστρας μία στρώση χαλίκι.

Μεταφυτεύστε την άνοιξη, κάθε 2-3 χρόνια, επιλέγοντας μία νέα γλάστρα, μεγαλύτερης διαστάσεων.

Ασθένειες και συμπτώματα

Μαραμένα φύλλα: πλεόνασμα ή έλλειψη νερού ή φωτός, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Μαραμένα φύλλα ή ξερά άκρα, ύπαρξη αποικιών μικρών εντόμων στα άκρα: μελίγκρα. Περιορίστε τα λιπάσματα και χρησιμοποιήστε ειδικό εντομοκτόνο.

Κιτριναμένα φύλλα και ξερά κατά μέρη, παρουσία αποικιών καφετί ασιδίων στα φύλλα και τις κορώνες: ψώρα. Αφαιρείται με το χέρι με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με μετουσιωμένη αλκοόλη και, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, με μία θεραπεία με βάση ένα ορκετέλαιο ενεργοποιημένο με εντομοκτόνο.

Κηλίδες και αράχνες στο κάτω μέρος των φύλλων: κόκκινος τετράνυχος. Παρέμβετε με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Ύπαρξη νεκρωτικών στρογγυλόμορφων κηλίδων καφετί χρώματος επάνω στα φύλλα: κηλίδωση των φύλλων της Δράκαινας (μυκητολογική ασθένεια). Αφαιρέστε τα προσβεβλημένα μέρη του φυτού και σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προτιμών για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Προσαρμόζεται εύκολα σε εσωτερικό χώρο και αναπτύσσεται ικανοποιητικά χωρίς πολλή φροντίδα



Έκθεση
Άφθονο φως αλλά χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο



Θερμοκρασία
Σταθερή και γύρω στους 20°C το καλοκαίρι και τους 15°C το χειμώνα



Νερό
Ποτίζετε 2 φορές την εβδομάδα το καλοκαίρι, 1 φορά το χειμώνα. Αποφύγετε τη στασιμότητα νερού



Χώμα
Με καλή αποστράγγιση, δύο μέρη τύρφης και ένα μέρος άμμου



Λίπασμα
Την άνοιξη ή το καλοκαίρι, χρησιμοποιείτε ένα υγρό προϊόν για πράσινα φυτά ή γενικής χρήσης, κάθε 15 ημέρες



Ανθοφορία
Τα φύλλα αποτελούν το καλλωπιστικό στοιχείο της δράκαινας και η ανθοφορία είναι μάλλον σπάνια



Πολλαπλασιασμός
Με ακραία μοσχεύματα που λαμβάνονται από τον κορμό ή από τα πλάινα κλαδιά

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλαιου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 07 ΜΟΝΣΤΕΡΑ

Βοτανική ονομασία

Monstera spp.

Προέλευση

Μεξικό και Ινδία

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλές φυτό με μακριά αναρριχητικά κλαδιά και ξυλώδη κορμό. Στους κορμούς σχηματίζονται ενσέρριες ρίζες, που το βοηθούν να στερεώνεται στα υποστηρίγματα. Τα ενήλικα φυτά απαιτούν πάσσαλο: ιδανικές είναι οι χνουδωτές ράβδοι. Τα φύλλα είναι πολύ μεγάλα, με περίγραμμα διακεκομμένο από εγκοπές ποικίλης μορφής. Χρώμα βαθύ πράσινο, επιφάνεια γυαλιστερή και σχεδόν κηρώδης. Στα ενήλικα φυτά, σε πολύ θερμό κλίμα ή στο θερμοκήπιο, κατά το θέρος, εμφανίζεται μία ταξιανθία σε σπάδικα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε θέσεις που δεν εκτίθενται πολύ στους ανέμους και που φωτίζονται καλά, αποφεύγοντας την άμεση επαφή με το ηλιακό φως.

Τοποθετήστε το φυτό σε ένα θερμό δωμάτιο, γιατί υποφέρει πολύ από το κρύο και από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Μην ξεχνάτε ότι σε θέσεις με υπερβολική σκιά σχηματίζονται μόνο μικρά φύλλα με σχήμα καρδιάς.

Ποτίζετε τακτικά, αυξάνοντας τη συχνότητα και τον αριθμό των ποτισμάτων κατά το θέρος και μειώνοντας το φθινόπωρο/χειμώνα.

Αν το φυτό είναι νεαρό, μεταφυτέψτε κάθε χρόνο την άνοιξη. Στη συνέχεια, μεταφυτεύετε κάθε 2-3 χρόνια.

Ασθένειες και συμπτώματα

Λευκά ή σκούρα κηρώδη ασπίδια, τα οποία παράγουν μεγάλες λευκές νιφάδες, συνήθως κοντά στον κορμό και στα πιο νεαρά φύλλα, τα οποία κάνουν το φυτό κολλώδες: λεπιοειδής ή βαμβακώδης ψώρα. Αντιμετωπίζεται με τη χρήση υγρής παραφίνης σε συνδυασμό με ειδικό εντομοκτόνο.

Υπαρξη πολύ μικρών κηλιδωτών κηλίδων στην επάνω και την κάτω όψη των φύλλων με παρουσία μικροσκοπικών αραχνών: ακάρεα. Χρησιμοποιήστε ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Ένα από τα καλύτερα φυτά για εσωτερικό χώρο με μεγάλα γυαλιστερά φύλλα



Έκθεση

Επιλέξτε φωτεινές περιοχές, χωρίς όμως άμεση έκθεση στο ηλιακό φως



Λίπασμα

Μην χορηγείτε λίπασμα πολύ συχνά και χρησιμοποιείτε λίπασμα γενικής χρήσης για πράσινα φυτά



Θερμοκρασία

Ελάχιστη θερμοκρασία το χειμώνα 15-20°C και μέγιστη 27-30°C. Υποφέρει από το κρύο



Ανθοφορία

Σπάνια, κατά το καλοκαίρι



Νερό

Τακτικά ποτισματα: άφθονα κατά την πιο θερμή εποχή, πιο αραιά και με φειδώ το χειμώνα



Πολλαπλασιασμός

Με ακραία μοσχεύματα που λαμβάνονται από τον κορμό



Χώμα

Με καλή αποστράγγιση και αποτελούμενο από μίγμα χώματος και τύρφης με άμμο για βαθιές γλάστρες

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπο
καλλιέργειας
Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 09 ΦΤΕΡΗ

Βοτανική ονομασία

Nephrolepis spp.

Προέλευση

Τροπικές περιοχές

Δυσκολία καλλιέργειας

Μέτρια-χαμηλή

Χαρακτηρίζεται από σκληρά και κρεμαστά φύλλα, καμπύλα και ελικοειδή, με μακριά λεπτά φυλλαράκια, πράσινου λαμπερού χρώματος, δαντελωτά και κυματοειδή. Στην κάτω όψη των φύλλων υπάρχουν μικρές καφετί δομές σε σχήμα φασολιού, που περιέχουν τα σπόρια με τα οποία αναπαράγεται το φυτό. Είναι ένα φυτό που δεν παράγει άνθη, καρπούς ή σπόρους.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε χώρους με αυξημένη υγρασία και σε θέσεις προστατευμένες από ηλιακές θερμότητες. Μην ξεχνάτε ότι η φτέρη χρειάζεται άφθονο και συχνό πότισμα και ότι το υπόστρωμά της δεν πρέπει να στεγνώνει ποτέ.

Μεταφυτέψτε συχνά, ακόμη και κάθε χρόνο, την άνοιξη. Χρησιμοποιήστε γλάστρες λίγο μεγαλύτερες από τις παλιές.

Ασθένειες και συμπτώματα

Ξερά φύλλα: ανεπαρκής υγρασία. Παρέμβετε βυθίζοντας το φυτό σε έναν κουβά γεμάτο με νερό για μερικά λεπτά.

Αποχρωματισμός των φύλλων: άμεση έκθεση στον ήλιο. Μετακινήστε το φυτό σε θέση με καλό φωτισμό, χωρίς όμως άμεσο ηλιακό φως.

Κιτρίνισμα των φύλλων, ύπαρξη αποικιών ασιπιδίων επάνω στη βλάστηση: ψώρα. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί ή ένα κομμάτι βαμβάκι εμβαπτισμένο σε αλκοόλη για να αφαιρέσετε τις αποικίες και, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, ακολουθήστε αγωγή με κατάλληλο εντομοκτόνο.

Ύπαρξη αποικιών μικρών εντόμων στις κορυφές των φύλλων, τα οποία έχουν την τάση να γκριζάρουν: μελίγκρα. Ακολουθήστε αγωγή με ειδικό εντομοκτόνο.

Φύλλα με μικρούς κοκκιοειδείς αποχρωματισμούς, ύπαρξη μικρών αραχνών στην κάτω όψη των φύλλων: ακάρεα. Ακολουθήστε αγωγή με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Αποχρωματισμός και κιτρίνισμα όλης της βλάστησης του φυτού: τροφopenία σιδήρου. Διακόψτε τα ποτίσματα με νερό της βρύσης και χρησιμοποιήστε βρόχινο νερό. Σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης σιδήρου, χρησιμοποιήστε ειδικό λίπασμα για αυτό το στοιχείο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Τα όμορφα πράσινα και ελικοειδή φύλλα χαρίζουν ομορφιά σε αυτό το φυτό



Έκθεση
Προτιμά το διάχυτο φως, αλλά μπορεί να ζήσει και στο ημίφως



Λίπασμα
Χορηγείται το καλοκαίρι



Θερμοκρασία
Το χειμώνα όχι μικρότερη από 10°C. Τις άλλες περιόδους, ιδανικά 18-20°C



Ανθοφορία
Δεν ανθοφορεί



Νερό
Ποτίζετε συχνά και ψεκάζετε συχνά τα φύλλα



Πολλαπλασιασμός
Με διαχωρισμό των κλαδιών ή με τα σπόρια



Χώμα
Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα
καλλιέργειας
Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 10 ΚΙΣΣΟΣ

Βοτανική ονομασία

Hedera helix

Προέλευση

Βόρειο Ημισφαίριο

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλές διακλαδιζόμενο φυτό με ανθεκτικά φύλλα, που καλλιεργείται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Από τον Hedera helix, ή τον κοινό κισσό, προέκυψαν πολλές ποικιλίες, που διακρίνονται κυρίως για τη μορφή, τις διαστάσεις και το χρωματισμό των φύλλων, μερικές φορές παρουσιάζουν διακυμάνσεις χρώματος (κίτρινα, χρυσά ή λευκά-κρεμ) γύρω από τα νεύρα. Είναι φυτά με περιορισμένες διαστάσεις, αλλά αν καλλιεργούνται σε γλάστρες επαρκούς μεγέθους ή στη γη, μπορούν να φτάσουν σημαντικές διαστάσεις.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Ως έρπον φυτό μπορεί να καλλιεργηθεί για να εμπλουτίσει τις συνθέσεις, σε κρεμαστές γλάστρες ή σε περβάζια και ράφια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναρριχητικό φυτό για να καλύψει τους τοίχους της βεράντας, χωρίς σπρίγματα, καθώς έχει διεισδυτικές ρίζες που κολλούν στις διάφορες επιφάνειες.

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός, ακόμη και στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ υποφέρει σε πολύ θερμά ή ξηρά περιβάλλοντα.

Αν τον καλλιεργείτε σε εξωτερικό χώρο, τοποθετήστε τον σε σκιερή θέση.

Αν τον καλλιεργείτε σε εσωτερικό χώρο, μεταφυτεύστε τον σε εξωτερικό χώρο προς τα τέλη της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού.

Διατηρείτε πάντοτε το χώμα υγρό.

Ασθένειες και συμπτώματα

Παραμόρφωση των φύλλων, ύπαρξη αποικιών μικρών εντόμων σε φύλλα και κορυφές: μελίγκρα. Περιορίστε τα λιπάσματα και χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Κιτρίνισμα της κάτω όψης των φύλλων ή των μίσχων, ύπαρξη αποικιών καφετί ή λευκών ασιπιδίων, τα οποία εκλύουν μία κολλώδη ουσία: ψώρα. Αφαιρέστε τα ασιπίδια με ένα πανί ή ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με αλκοόλη και, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, ακολουθήστε θεραπεία με ορυκτέλαιο ενεργοποιημένο με εντομοκτόνο.

Φύλλα με μικρούς κιτρινωπούς αποχρωματισμούς στην επιφάνεια και ύπαρξη μικρών αραχνών στην κάτω όψη: ακάρεα. Χρησιμοποιήστε ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Ύπαρξη σήψεων στη βάση του φυτού: σήψη της βάσης ή του λαιμού (μυκητολογική ασθένεια). Μειώστε τα ποτίσματα, διατηρήστε καλή αποστράγγιση στο χώμα, αφαιρέστε τα μέρη του φυτού που παρουσιάζουν συμπτώματα και, σε περίπτωση έντονης συμπτωματολογίας, χρησιμοποιήστε ένα μυκητοκτόνο.

Παρουσία μούχλας με μορφή λευκής σκόνης στο επάνω περίγραμμα των φύλλων: ωίδιο ή λευκή σήψη. Χρησιμοποιήστε μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή ένα ειδικό ωιδιοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Προσαρμόζεται καλά, είναι ανθεκτικός και καλλιεργείται εύκολα



Έκθεση

Μέσα στο διαμέρισμα σε φωτεινή θέση, σε εξωτερικό χώρο σε σκιερό περιβάλλον, προστατευμένο από τον ήλιο



Θερμοκρασία

Το χειμώνα η ιδανική θερμοκρασία είναι 10-15°C, αλλά αντέχει καλά και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες



Νερό

Αρκούν ένα-δύο ποτίσματα την εβδομάδα το καλοκαίρι και μόνο ένα το χειμώνα



Χώμα

Συνιστάται χώμα καλλιέργειας πλούσιο σε οργανικές ουσίες



Λίπασμα

Περίπου κάθε 20-30 ημέρες, από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο, με υγρό λίπασμα για πράσινα φυτά



Ανθοφορία

Δεν ανθοφορεί



Πολλαπλασιασμός

Με ακραία μοσχεύματα ή καταβολάδες

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα
καλλιέργειας
Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 11 ΦΙΛΟΔΕΝΔΡΟΝ

Βοτανική ονομασία

Philodendron spp.

Προέλευση

Κεντρική και τροπική Αμερική

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Το γένος περιλαμβάνει περίπου 300 είδη αειθαλών φυτών θερμοκλήπιου ή διαμερισματος. Μακρύς μίσχος και εναέριες ρίζες βοηθούν το φυτό να γαντζωθεί σε υποστηρίγματα. Φύλλα μεγάλα, σε απόσταση και σε διάφορες μορφές: μακριά, οβάλ, καρδιοειδή, τοξοειδή, ολόκληρα, διαχωριζόμενα σε λοβούς, με εγχοπέδες ή συνεχόμενη περίμετρο, σε τόνους του πράσινου ή πράσινο διάσπικτο με λευκό. Τα άνθη, ασήμαντα, ενώνονται σε μία κυλινδρική ταξιανθία, που περιβάλλεται από ένα κωνικό φύλλο λευκό, κόκκινο ή κίτρινο.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Απαιτεί αυξημένη και συνεχή υγρασία περιβάλλοντος, ενώ δεν αντέχει να έχει ρίζες σε χώμα κορεσμένο από νερό.

Μην ξεχνάτε ότι από το Νοέμβριο ως το Μάρτιο μειώνονται κατά πολύ τα ποτίσματα και διακόπεται η χορήγηση λιπασμάτων.

Καθαρίζετε τα φύλλα κάθε 30 ημέρες περίπου με ένα κομμάτι βαμβάκι εμβαπτισμένο σε νερό, για να αφαιρέσετε τη σκόνη.

Κλαδεύετε τακτικά και μεταφυτεύετε όταν η γλάστρα γεμίζει ρίζες και στην επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε γλάστρα μεγαλύτερη κατά 2-3 cm.

Ασθένειες και συμπτώματα

Υπαρξη καφετί κηλίδων στην επιφάνεια των φύλλων, τα οποία στη συνέχεια φθίνουν και νεκρώνονται: ανθράκωση (μυκητολογική ασθένεια). Αποφύγετε την υπερβολική υγρασία και διατηρήστε καλή αποστράγγιση στο χώμα, αφαιρέστε τα μέρη του φυτού που παρουσιάζουν συμπτώματα και, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, ακολουθήστε θεραπεία με ένα μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό.

Λευκά κηρώδη ασπίδια, τα οποία παράγουν μεγάλες λευκές νιφάδες, συνήθως κοντά στον κορμό και στα πιο νεαρά φύλλα: λεπισειδής ή βαμβακώδης ψώρα. Αντιμετωπίζεται με τη χρήση υγρής παραφίνης σε συνδυασμό με ειδικό εντομοκτόνο.

Υπαρξη πολύ μικρών κηλιδωτών κηλίδων στην επάνω και την κάτω όψη των φύλλων με παρουσία μικροσκοπικών αραχνών: ακάρεα. Χρησιμοποιήστε ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προιόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προιόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Πράσινο φυτό για εσωτερικούς χώρους με υπέροχα φύλλα σε διάφορα σχήματα. Εύκολη καλλιέργεια



Έκθεση
Σε περιοχές με έντονο φως



Λίπασμα
Χορηγείτε υγρό λίπασμα από τον Μάιο ως τον Σεπτέμβριο κάθε 15 ημέρες περίπου



Θερμοκρασία
Όχι μικρότερη από 14°C



Ανθοφορία
Δεν ανθοφορεί



Νερό
Ποτίζετε συνεχώς το καλοκαίρι, μειώστε σημαντικά το χειμώνα



Πολλαπλασιασμός
Μέσω ακραίου μοσχεύματος στα μέσα της άνοιξης



Χώμα
Ελαφρύ, με φύλλα οξιάς. Να διαπρέπει υγρό το καλοκαίρι

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπο
καλλιέργειας
Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλαι 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 18 KENTIA

Βοτανική ονομασία

Howea spp.

Προέλευση

Νήσος Lord Howe (Ωκεανία)

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλής φοίνικας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το πυκνό και καλλωπιστικό φύλλωμα, παρουσιάζει μικρούς μίσχους και κρεμαστά φύλλα, με ωραίο σκούρο πράσινο χρώμα, τα οποία αποτελούνται από φυλλαράκια μικρού πλάτους, αλλά με μήκος που φτάνει τα 60 cm, με μυτερά άκρα και ανάγλυφα νεύρα. Και σε εσωτερικό χώρο μπορεί να φτάσει σε σημαντικές διαστάσεις, μέχρι τα 3 μέτρα σε ύψος και τα 2 μέτρα σε διάμετρο.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το φυτό σε θέση προστατευμένη από τα ρεύματα και τις ριπές αέρα και προστατεύστε το από τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. Βάλτε το σε θέσεις με καλό φωτισμό, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεση στο φως του ήλιου.

Διατηρείτε πάντοτε υγρό το υπόστρωμα, χωρίς υπερβολές με την ποσότητα νερού που του χορηγείτε και ψεκάζετε συχνά.

Μεταφυτεύστε την άνοιξη και μόνο αν οι ρίζες έχουν καταλάβει όλο το διαθέσιμο χώρο στη γλάστρα.

Ασθένειες και συμπτώματα

Καφετί χρώμα των φύλλων: υπερβολική ποσότητα ή έλλειψη νερού, έκθεση σε ρεύματα ψυχρού αέρα.

Φθορά και κιτρίνισμα των φύλλων, ύπαρξη αποικιών λευκών ή σκούρων ασιπιδίων σε φύλλα και κορμόνες: ψώρα. Αφαιρείται με ένα ωπό πανί ή με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με αλκοόλη. Σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, συνίσταται θεραπεία με βάση υγρή παραφίνης ενεργοποιημένης με εντομοκτόνο.

Κίτρινα άκρα των φύλλων, τα οποία καταλήγουν σε πιο εκτεταμένες βλάβες και ρωγμές μέχρι που τα φύλλα να γίνουν διάφανα: ακάρεα. Εξαλείφονται διατηρώντας σωστή υγρασία γύρω από το φυτό και με θεραπεία, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, με ειδικό ακαροκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε όλο το φυτό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Από τους ωραιότερους φοίνικες εσωτερικού χώρου με εύκολη καλλιέργεια




Έκθεση

Πολύ φωτεινό περιβάλλον, όχι όμως άμεση έκθεση στον ήλιο. Αντέχει σε λίγο φωτισμό, αλλά αναπτύσσεται πολύ πιο αργά



Λίπασμα

Την περίοδο ανάπτυξης προσθέστε σταδιακά υγρό λίπασμα στο νερό ποτίσματος




Θερμοκρασία

Όχι μικρότερη από 14°C. Ιδανική: 20°-25°C



Ανθοφορία

Πολύ σπάνια



Νερό

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, αρκεί να διατηρείτε το χώμα υγρό



Πολλαπλασιασμός

Με σπόρο σε δίσκο φυτών στα τέλη Φεβρουαρίου



Χώμα

Ελαφρύ μίγμα αποτελούμενο κυρίως από χώμα με τύρφη και άμμο

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κύπρου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου

20

ΣΕΦΛΕΡΑ

Βοτανική ονομασία

Schefflera spp.

Προέλευση Τροπική Αφρική και νοτιανατολική Ασία

Δυσκολία καλλιέργειας
Μέτρια

Έχει τη μορφή μικρού θάμνου με ξυλώδεις, αλλά μαλακούς μίσχους, που έχουν τάση να λυγίζουν και τότε πρέπει να τους τοποθετηθούν υποστηρίγματα. Έχει ωραία σπειροειδή οβάλ φύλλα, τα οποία συνενώνονται κατά ομάδες που αναπτύσσονται από τον ίδιο σφθαλμό. Τα φύλλα είναι γυαλιστερά, ομοιόμορφου πράσινου χρώματος ή πιτσιλωτά και τους αρέσει να διαπρουνται καθαρά. Η γενική όψη του φυτού προσδίδει μία ελαφρότητα: το φύλλωμα μπορεί να είναι πλούσιο, αλλά δεν είναι ποτέ βαρύ ούτε φορτωμένο.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Τοποθετήστε το σε ανοιχτούς χώρους τους ζεστούς μήνες, προστατευμένο από τις ακτίνες του ήλιου. Καθώς το φυτό προέρχεται από τις θερμές χώρες, δεν αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες: ποτέ θερμοκρασία μικρότερη από 10°C.

Προτιμήστε το μαλακό χώμα και ποτίζετε τακτικά και με φειδώ. Ανέχεται χωρίς πρόβλημα πιθανές περιόδους ξηρασίας, αλλά αποφύγετε τα στάσιμα νερά.

Μεταφύτευστε την άνοιξη, σε γλάστρες μεγαλύτερες, με υπόστρωμα ανακατεμένο με λίπασμα.

Ασθένειες και συμπτώματα

Αλλοιώσεις και παραμορφώσεις των νεαρών βλαστών, ύπαρξη αποικιών μικρών εντόμων: μελίγκρα. Ακολουθήστε αγωγή με ειδικό εντομοκτόνο.

Ξερά άκρα, νέκρωση και κιτρίνισμα των φύλλων, ύπαρξη μικροσκοπικών αραχνών στην κάτω όψη των φύλλων: ακάρεα. Αναπτύσσονται αν το επίπεδο υγρασίας είναι χαμηλό. Επομένως, αυξήστε το επίπεδο υγρασίας με συχνούς ψεκασμούς και χρησιμοποιήστε ειδικά ακαρεοκτόνα, φροντίζοντας να βρέχετε καλά όλο το φύλλωμα.

Φθορά του φυτού, ύπαρξη αποικιών ασπιδίων, τα οποία εκκρίνουν μία κολλώδη ουσία: ψώρα. Αφαιρέστε με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο ελαφρώς με αλκοόλη και, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, εφαρμόστε θεραπεία με ορυκτέλαιο ενεργοποιημένο με ειδικό εντομοκτόνο.

Ύπαρξη μικρών στρογγυλόμορφων κηλίδων, αρχικά ανοιχτού πράσινου και στη συνέχεια σκούρου πράσινου χρώματος, που τελικά νεκρώνονται: βακτηριακή κηλίδωση της Σεφλέρας (βακτηριακή ασθένεια). Ευνοήστε τον αερισμό των εναέριων μερών του φυτού, αποφύγετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το στάσιμο νερό και, σε περίπτωση έντονης συμπτωματολογίας, ακολουθήστε αγωγή με ένα σκεύασμα με βάση το χαλκό.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Ανεκτικό φυτό, με εύκολη καλλιέργεια και ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο στις πιο ποικίλες συνθήκες ζωής



Έκθεση
Τοποθετήστε στο φως, αλλά ποτέ σε απευθείας έκθεση στον ήλιο



Λίπασμα
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις λιπάσματος



Θερμοκρασία
Το χειμώνα σταθερή 12-15°C. Το καλοκαίρι όχι πάνω από 26°C



Ανθοφορία
Δεν ανθοφορεί



Νερό
Απαιτεί τακτικό πότισμα με φειδώ. Το χώμα πρέπει να διατηρείται πάντοτε υγρό



Πολλαπλασιασμός
Με μόσχευμα στις αρχές της άνοιξης, τον Απρίλιο, και με καταβολάδα



Χώμα
Ελαφρύ, αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από τύρφη, φύλλα και άμμο

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



Έντυπα Καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012- SBB AE - Αεροφ. Ηρακλείου 453 & Κύπρου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου **06** Τ Σ Ι Κ Α Σ

Βοτανική ονομασία

Cycas revoluta

Προέλευση

Αμερική, Ασία

Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Έχει την όψη μικρού φοίνικα, αναπτύσσεται την άνοιξη, γύρω από έναν μεγάλο και κοντό κορμό. Η ανάπτυξή του είναι αργή αλλά τα φύλλα του μπορεί να φτάσουν και τα δύο μέτρα μετά από κάποια χρόνια σε ζεστό μεσογειακό κλίμα. Ένα εντυπωσιακό κεντρικό άνθος που μερικές φορές εμφανίζεται στην άκρη του κορμού δίνει στον κήπο μια μοναδική εξωπική όψη. Προσοχή όμως, το τσίκας περιέχει δηλητήριο επικίνδυνο για τα κατοικίδια ζώα.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Φυτέψτε το στο έδαφος ή σε γλάστρα. Προτιμήστε εξωτερικούς χώρους με ήλιο και ζέση. Επιλέξτε ένα σημείο προστατευμένο από τον αέρα. Εάν το τσίκας καλλιεργείται σε εσωτερικό χώρο, τον Οκτώβριο μεταφέρετέ το κοντά σε παράθυρο ή σε φωτεινό δωμάτιο. Μεταφυτέψτε την άνοιξη περίπου κάθε 3 χρόνια.

Ποτίστε τακτικά από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, αποφεύγοντας το υπερβολικό πότισμα.

Χρησιμοποιήστε χώμα για γλάστρα και το-

ποθετήστε χαλίκι στο κάτω μέρος για καλή αποστράγγιση.

Το χειμώνα το χώμα πρέπει να είναι σχετικά στεγνό και τα ποτίσματα αραιά. Την άνοιξη προσθέστε λίπασμα για να βελτιωθεί η ανάπτυξη.

Την άνοιξη εμφανίζονται περίπου 30 νέα φύλλα. Μετά από κάποια χρόνια, αναπτύσσεται ένα λουλούδι ανάμεσα στα φύλλα, με κωνικό σχήμα στα αρσενικά φυτά και σφαιρικό σχήμα στα θηλυκά. Το τσίκας δεν ανθοφορεί όταν βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο.

Ασθένειες και συμπτώματα

Παραμορφωμένα φύλλα: ανεπαρκής φωτισμός ή υπερβολικό πότισμα. Μετακινήστε το φυτό σε φωτεινό χώρο και μειώστε το πότισμα φροντίζοντας για καλή αποστράγγιση.

Κίτρινα ή καφέ φύλλα: φυσική εξέλιξη του φυτού το οποίο κάνει τα παλιά φύλλα για να δημιουργήσει καινούργια. Αν ωστόσο δεν βγουν νέα φύλλα οφείλεται σε υπερβολικό πότισμα ή σε κακή αποστράγγιση του εδάφους.

Κίτρινες ή κόκκινες κηλίδες στα φύλλα: αδύναμο χώμα με έλλειψη μαγνησίου στο οποίο το τσίκας είναι πολύ ευαίσθητο. Χρησιμοποιήστε θειικό μαγνήσιο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Για να αποκτήσει το τσίκας ένα εντυπωσιακό κεντρικό άνθος, τοποθετήστε το σε εξωτερικό χώρο



Έκθεση
Τοποθετήστε στο φως, αλλά ποτέ σε απευθείας έκθεση στον ήλιο



Λίπασμα
Κάθε 15 ή 30 μέρες από το Μάρτιο ως το Σεπτέμβριο



Θερμοκρασία
Τουλάχιστον 15°C. Κρατήστε το φυτό μέσα στο σπίτι από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη



Ανθοφορία
Λουλούδια εμφανίζονται σπάνια όταν το φυτό βρίσκεται μέσα στο σπίτι



Νερό
Ποτίζετε με φειδώ κατά την ανάπτυξή του. Αφήστε το χώμα να στεγνώσει πριν το επόμενο πότισμα. Ελάχιστο νερό το χειμώνα



Πολλαπλασιασμός
Με διαίρεση των κύριων βλαστών με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της μεταφύτευσης



Χώμα
Ειδικό χώμα με άμμο. Προσθέστε χαλίκι για καλύτερη αποστράγγιση

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





© Copyright 2012 - SBB AE - Αεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Πράσινα φυτά εσωτ. χώρου 08 ΖΑΜΙΟΚΟΥΛΚΑΣ

Βοτανική ονομασία
Zamioculcas zamifolia
Προέλευση
Τροπική Αφρική
Δυσκολία καλλιέργειας
Χαμηλή

Τροπικό φυτό με χαρακτηριστικά κάθετα κλαδιά και άκαμπτους μίσχους και φύλλα. Είναι φυτό εσωτερικού χώρου με μικρές απαιτήσεις σε νερό και φροντίδα. Καλλιεργείται σε γλάστρα και το ύψος του μπορεί να φτάσει το ένα μέτρο.

Οι συμβουλές Leroy Merlin

Καλλιέργεια

Δεν καλλιεργείται σε εξωτερικό χώρο γιατί δεν αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες. Τοποθετήστε το φυτό κοντά σε παράθυρο σε σημείο με καλό φωτισμό. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο, το φυτό ανθοφορεί και στην σκιά.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι ποτίστε με μέτρο και ελάχιστα το χειμώνα γιατί το χώμα με υγρασία ή το στάσιμο νερό καταστρέφει το φυτό.

Μεταφυτέψτε κάθε δύο χρόνια σε μεγαλύτερη γλάστρα ώστε να αναπτυχθούν σωστά οι ρίζες.

Ασθένειες και συμπτώματα

Αδύναμα και κίτρινα φύλλα: υπερβολικό πότισμα. Μην ξεχνάτε πως χρειάζεται ελάχιστο νερό.

Λεπτοί μίσχοι, λίγα φύλλα: έλλειψη φωτός. Άσπρα παράσιτα κάτω από τα φύλλα: ψώρα. Χρησιμοποιήστε αλκοόλ για να απομακρύνετε τα παράσιτα εάν δεν υπάρχουν πολλά, διαφορετικά χρησιμοποιήστε το κατάλληλο παρασιτοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

Τροπικό φυτό που αγαπάει τη ζέση



Έκθεση
Αντέχει σε άμεση έκθεση στον ήλιο λίγες ώρες την ημέρα



Λίπασμα
Κάθε 15 ή 30 μέρες από το Μάρτιο ως το Σεπτέμβριο



Θερμοκρασία
Τουλάχιστον 15°C. Κρατήστε το φυτό μέσα στο σπίτι από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη



Ανθοφορία
Λουλούδια εμφανίζονται σπάνια όταν το φυτό βρίσκεται μέσα στο σπίτι



Νερό
Ποτίζετε με φειδώ κατά την ανάπτυξή του. Αφήστε το χώμα να στεγνώσει πριν το επόμενο πότισμα. Το χειμώνα χρειάζεται ελάχιστο νερό



Πολλαπλασιασμός
Με διαίρεση των κύριων βλαστών με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της μεταφύτευσης



Χώμα
Ειδικό χώμα με άμμο. Προσθέστε χαλίκι για καλύτερη αποστράγγιση.

www.leroymerlin.gr



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

