

# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



## Θάμνοι ανθοφόροι

01

## ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

### Βοτανική ονομασία

Nerium oleander

### Προέλευση

Λεκάνη της Μεσογείου

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλές δένδρο ή θάμνος με δερματώδη, λοχειοδή φύλλα, με ιδιαίτερα εμφανείς νευρώσεις στο κάτω μέρος, και με πράσινο-γκρι ή πράσινο-κιτρινωπό χρώμα.

Τα άνθη, τα οποία συνήθως αποτελούνται από πέντε πέταλα, ενώνονται σε θυσάνους στα άκρα και το χρώμα τους ποικίλλει, από λευκό, ροζ, κόκκινο, μωβ, ως εκρού και κίτρινο. Υπάρχουν επίσης ποικιλίες με διπλό χρώμα, με ένα χρώμα ανά άνθος ή με δίχρωμα άνθη.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Η πικροδάφνη, χαρακτηριστικό είδος της μεσογειακής κλωρίδας, αναπτύσσεται ιδανικά σε περιοχές με θερμό και ξηρό κλίμα.

Στα ηπειρωτικά κλίματα, είναι προτιμότερο να καλλιεργείται σε γλάστρες, όπου αναπτύσσεται αρκετά καλά, και να φυλάσσεται σε προστατευμένο χώρο το χειμώνα. Επιλέξτε μία γλάστρα μεγάλων διαστάσεων, επειδή η πικροδάφνη

αναπτύσσει βαθιές ρίζες. Μεταφυτεύστε τη την άνοιξη, μόνο εφόσον το σύστημα των ριζών έχει καταλάβει όλο το διαθέσιμο χώρο.

Αν την καλλιεργείτε στο χώμα, φυτέψτε την τον Απρίλιο και προσθέστε της ένα υγρό λίπασμα. Μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο ως θάμνος όσο και ως δενδρύλλιο.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Κίτρινα φύλλα που πέφτουν: χαμηλές θερμοκρασίες, ανεπαρκές φως, μεταφέρετε το φυτό σε φωτεινό και περισσότερο προστατευμένο χώρο.

Φύλλα με μαυρόσπρα στίγματα: καπνιά (μυκητολογική ασθένεια). Αντιμετωπίστε με μυκητοκτόνα με βάση το χαλκό και εφαρμόστε μέτρα προστασίας κατά της μελίγκρας και της ψώρας που ευθύνονται για την έκκριση μελάσας (σακχαρωδών ουσιών) επί της οποίας αναπτύσσεται η καπνιά.

Ανθράκωση γύρω από τους μίσχους: νέκρωση των κλαδιών (μυκητολογική ασθένεια). Αφαιρέστε τα μέρη που έχουν επηρεαστεί και, σε περίπτωση βαριάς προσβολής, αντιμετωπίστε με μυκητοκτόνα με βάση το χαλκό.

Ζαρωμένες, άρρωστες και μαραμμένες κορυφές των φύλλων, παρουσία αποικιών μικρών εντόμων στις κορυφές των βλαστών: μελίγκρα. Σε περίπτωση βαριάς προσβολής, παρέμβετε συστηματικά με ειδικό εντομοκτόνο.

Γενικός μαρασμός του φυτού, κίτρισμα και ανθράκωση των φύλλων, παρουσία ασπιδίων στα κλαδιά: ψώρα. Κλαδέψτε το φυτό ώστε να είναι δυνατή η καλή έκθεση στο φως του εσωτερικού του φυλλώματος, καταστρέψτε τα φύλλα και τα μπουμπούκια που έχουν πληγεί και, σε περίπτωση βαριάς προσβολής, παρέμβετε με παραφινέλαιο ενεργοποιημένο με ειδικό εντομοκτόνο.

Απώλεια λάμψης των φύλλων με σταδιακό κίτρινισμα, παρουσία μικροσκοπικών ιστών στην κάτω επιφάνεια των φύλλων: ακάρεα. Ψεκάστε το φυτό με νερό και σε περίπτωση βαριάς προσβολής, αντιμετωπίστε με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να καλύψετε καλά όλο το φυλλωμα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Θάμνος με πλούσια άνθηση σε έντονα χρώματα



#### Έκθεση

Σε πλήρους θάψης.

Αντέχει στο ημίφως, αλλά παράγει πιο πολλά φύλλα



#### Θερμοκρασία

Τουλάχιστον 5°C. Στο βορρά, πρέπει να προστατεύεται από το κρύο με διαπνέον κάλυμμα κατά του πάγου



#### Νερό

Άφθονο πόσιμο κατά τη θερινή περίοδο ανάπτυξης και ανθοφορίας. Το χειμώνα το έδαφος πρέπει να διαπνέεται αρκετά υγρό



#### Λίπασμα

Στα φυτά που καλλιεργούνται σε γλάστρα, χορηγείται υγρό λίπασμα διαλυμένο σε νερό κάθε 15 ημέρες, από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο



#### Ανθοφορία

Από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο



#### Πολλαπλασιασμός

Με μοσχεύματα 6-8 cm που λαμβάνονται το καλοκαίρι από ημιώριμους βλαστούς

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





## Θάμνοι ανθοφόροι

04

## ΜΙΜΟΖΑ

### Βοτανική ονομασία

Acacia dealbata

### Προέλευση

Αυστραλία, Κεντρική Αμερική

### Δυσκολία καλλιέργειας

Μέτρια

Τα φύλλα αποτελούνται από πολλά φυλλαράκια διατεταγμένα κάθετα προς τα κεντρικά νεύρα (σε διπλή σειρά). Τα άνθη έχουν τη μορφή μικρών σφαιρικών νιφάδων, ενωμένα σε συστάδες, είναι έντονου κίτρινου χρώματος, όμορφα και αρωματικά. Ο κορμός της νεαρής μιμόζας είναι μαλακός και εύκαμπτος, και γι' αυτό στη γλάστρα τοποθετείται ένα υποστήριγμα, στο οποίο στερεώνονται τα ψηλότερα κλαδιά. Αν καλλιεργείται στο χώμα, μπορεί να φτάσει σε μεγάλο ύψος, μέχρι 30 μέτρα. Στη γλώσσα των λουλουδιών, η μιμόζα είναι σύμβολο δύναμης και θηλυκότητας.

### Οι συμβουλές Leroy Merlin

#### Καλλιέργεια

Η μιμόζα αγαπά τα εύκρατα ζεστά κλίματα και ζει καλά κάτω από τον ήλιο και σε θέση προστατευμένη από τους ανέμους.

Αν την καλλιεργείτε στον κήπο, επιλέξτε μία προστατευμένη γωνία ή εμπρός από ένα τοίχο με νότιο προσανατολισμό. Προετοιμάστε ένα λάκκο λίγο μεγαλύτερο από τη γλάστρα της και, στον πυθμένα του, προετοιμάστε δύο στρώσεις: μία από χαλίκι και μία από χώμα

μεταφύτευσης με οργανικό λίπασμα. Καλύψτε καλά με το χώμα και ποτίστε.

Αν την καλλιεργείτε σε γλάστρα, μέχρι το Σεπτέμβριο, αφήστε την στη γλάστρα στην οποία την αγοράσατε. Μόνο τότε μεταφύτεψτε την σε μία μεγαλύτερη κατά 5 cm. Κάντε το ίδιο κάθε χρόνο, πάντοτε το φθινόπωρο. Όταν το φυτό μεγαλώσει και σταθεροποιηθεί, τοποθετήστε το σε μία τετράγωνη γλάστρα των 40 cm.

#### Ασθένειες και συμπτώματα

Κιρίνιασμα, μετά από ξαφνική ξήρανση του φυλλώματος, σήψη της ρίζας λόγω φυτόφθορας καρπών (μυκητολογική ασθένεια). Μειώστε τα ποτίσματα, βελτιώστε την αποστράγγιση και θεραπεύστε τους τραυματισμούς της ρίζας ακολουθώντας τοπικές αγωγές με προϊόντα με βάση το χαλκό, διαφορετικά χρησιμοποιήστε ειδικά μυκητοκτόνα.

Παρουσία μικρών εντόμων σαν ψύλλοι στα κλαδιά, τα οποία παράγουν μεγάλη ποσότητα σακχαρώδους ουσίας (μελάσα): ψύλλα. Ακολουθήστε ειδικές θεραπείες με συστηματικά εντομοκτόνα σε συνδυασμό με υγρή παραφίνη.

Παρουσία ασπιδίων στα κλαδιά: ψώρα. Σκουπίστε με μια βούρτσα τα κλαδιά που παρουσιάζουν το πρόβλημα και, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, πραγματοποιήστε ειδικές θεραπείες με συστηματικά εντομοκτόνα, σε συνδυασμό με υγρή παραφίνη.

#### Τα ανθισμένα κλαδιά της αναζωογονούν τις τελευταίες ημέρες του κρύου χειμώνα



#### Έκθεση

Στον ήλιο ή σε μερική σκιά



#### Θερμοκρασία

Ποτέ κάτω από 0°C. Ευαίσθητη στο κρύο. Αν την καλλιεργείτε σε γλάστρα, το χειμώνα μεταφέρετέ την μέσα στο σπίτι σε φωτεινό σημείο



#### Νερό

Μία φορά την εβδομάδα την άνοιξη. Συντά ποτίσματα το καλοκαίρι, όμως χωρίς υπερβολές, επειδή υποφέρει πολύ από στασιμότητες νερού



#### Χώμα

Καλλιέργεια σε γλάστρα: ειδικό χώμα για οξύφιλα φυτά. Καλλιέργεια στο χώμα: όξινο χώμα, πλούσιο σε οργανικές ουσίες



#### Λίπασμα

Ιανουάριο με Μάρτιο, κάθε 15 ημέρες, χρησιμοποιείτε ένα λίπασμα για ανθοφόρα φυτά. Θα διεγείρει την ανθοφορία



#### Ανθοφορία

Πολύ πρόωμη, από τα μέσα Φεβρουαρίου ως το Μάρτιο. Άνθος της γιορτής της γυναίκας, που συμπίπτει με τις ημέρες της μέγιστης ανθοφορίας



#### Πολλαπλασιασμός

Με μόσχευμα ή με σπόρο

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόλλων 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

## Θάμνοι ανθοφόροι

07

## Ρ Ο Δ Ι Α

### Βοτανική ονομασία

*Punica granatum*

### Προέλευση

Περσία, Αφγανιστάν

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Θάμνος ή μικρό δένδρο, καλλιιεργείται από την αρχαιότητα για τους γλυκούς όξινους καρπούς της. Έχει μικρά λεία φύλλα, οβάλ σχήματος, με ζωηρό πράσινο χρώμα και έντονα χρωματιστά άνθη. Τα άνθη είναι πορτοκαλί, πορτοκαλί με λευκά στίγματα ή κίτρινα. Απλά ή διπλά, μεμονωμένα ή ενωμένα κατά 2 ή 3. Ο καρπός είναι μεγάλος και σαρκώδης, με λείο και δερματώδη φλοιό. Περιλαμβάνει σπέρματα διαιρεμένα σε 7-15 διαμερίσματα με γλυκιά και ζουμερή σάρκα. Οι καρποί συλλέγονται το φθινόπωρο και καταναλώνονται το χειμώνα, όταν έχουν ωριμάσει.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Μεταφυτέψτε το φυτό την κρύα εποχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές με πιο δριμύ κλίμα πρέπει να επιλέξετε μία προστατευμένη θέση (πλάι σε έναν τοίχο). Επίσης, καλό είναι να προτιμάτε πάντοτε θέση με ανατολικό ή νότιο προσανατολισμό.

Αναπτύσσεται αργά και, για να λάβετε καρπούς, οι οποίοι είναι υψηλής αισθητικής αξίας,

θυμηθείτε να κόβετε τα κλαδιά που είχαν δώσει καρπούς το προηγούμενο έτος.

Το καλοκαίρι, ποτίζετε το δένδρο, αν η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ξηρή και σκαλίζετε το χώμα γύρω από το φυτό, αν είναι πολύ σκληρό.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Παραμορφωμένα και άτονα φύλλα και βλαστοί, παρουσία αποικίας μικρών πράσινων ή γκριζών εντόμων: μελίγκρα. Αντιμετωπίστε με ειδικά εντομοκτόνα, κατά προτίμηση συστηματικά.

Κιτριτισμένα φύλλα και καχεξία του φυτού, παρουσία ασπιδίων στα υποκοτύλια: ψώρα. Σκουπίστε για να αφαιρέσετε τα έντομα, διαφορετικά, σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, χρησιμοποιήστε υγρή παραφίνη ενεργοποιημένη με ειδικά εντομοκτόνα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Παράγει άνθη κόκκινου-πορτοκαλί χρώματος, τα οποία ξεχωρίζουν μέσα από το λαμπερό πράσινο φύλλωμα



#### Έκθεση

Σε προστατευμένη θέση και στον ήλιο



#### Θερμοκρασία

Ήπιες θερμοκρασίες, ιδίως το χειμώνα (ποτέ κάτω από 0°C). Δεν φοβάται τους αναιξιατικούς παγετούς, καθώς ανθίζει άψιμα



#### Νερό

Ποτίστε μετά τη φύτευση. Κατά τη βλαστική περίοδο (Απρίλιος-Οκτώβριος), ποτίζετε όσο χρειάζεται



#### Χώμα

Γόνιμο χώμα μέτριας ανάμιξης



#### Λίπασμα

Χορηγήστε οργανικά λιπάσματα. Στη συνέχεια, βάλτε λίπασμα στο χώμα από την άνοιξη ως τα τέλη Αυγούστου



#### Ανθοφορία

Τα άνθη ανοίγουν μόλις το κλίμα γίνει οριστικά θερμό, το Μάιο και τον Ιούνιο



#### Πολλαπλασιασμός

Ξεκollώντας τα παραβλαστήματα που συχνά μεγαλώνουν στη βάση της ρίζας του μητρικού δένδρου, με μόσχευμα ή με εμφύτευση

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





## Θάμνοι ανθοφόροι

08

## ΡΟΔΟΔΕΝΤΡΟ

### Βοτανική ονομασία

Rhododendron spp.

### Προέλευση

Κίνα

### Δυσκολία καλλιέργειας

Χαμηλή

Αειθαλής χονδροειδής θάμνος ορεινής προέλευσης με μικρά οβάλ φύλλα, με λαμπερό σκούρο πράσινο χρώμα στην άνω όψη και πιο ανοικτό πράσινο στην κάτω όψη. Τα άνθη έχουν απλό ή διπλό κάλυκα, είναι ρυτιδωμένα και ενωμένα σε ομάδες των 2-5.

Τα χρώματά τους είναι ζωηρά και απαλά: λευκό, ροζ ή κόκκινο και ανθοφορούν την άνοιξη ή το φθινόπωρο.

### Οι συμβουλές Leroy Merlin

#### Καλλιέργεια

Το ροδόδεντρο προτιμά δροσερό και σκιερό κλίμα, ιδανικά είναι τα βορινά μπαλκόνια και οι κήποι.

Υποφέρει από στασιμότητα νερού: εξασφαλίστε καλή αποστράγγιση στο βάθος της γλάστρας με εναπόθεση μίας στρώσης διογκωμένου αργίλου.

Μεταφύτεψτε κάθε 1-2 χρόνια σε δοχεία με-

γαλύτερης διαμέτρου. Οι συνιστώμενοι μήνες για τη μεταφύτευση είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.

Στο τέλος της περιόδου ανθοφορίας, αφαιρέστε με το χέρι τα άνθη που έχουν πια μαραθεί. Με αυτό τον τρόπο, ευνοείται η βλάστηση, η καλύτερη ανάπτυξη και η πλούσια ανθοφορία το επόμενο έτος.

#### Ασθένειες και συμπτώματα

Τα φύλλα και τα άνθη ξεραίνονται και πέφτουν: αυξημένη θερμοκρασία ή ανεπαρκής ποσότητα νερού, βάλτε το στη σκιά και ποτίστε το άφθονα.

Μπουμπούκια που δεν ανθίζουν: πλεόνασμα νερού, αφήστε το χώμα να στραγγίσει τελείως πριν αρχίσετε ξανά να το ποτίζετε, με φειδώ.

Φύλλα με ημικυκλικές βλάβες στην περιφέρεια: ύπαρξη ωπύορρυγχου. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εντομοκτόνο.

Παρουσία ασπιδίων στα κλαδιά: ψώρα. Σκουπίστε με μια βούρτσα τα κλαδιά που παρουσιάζουν το πρόβλημα και, στις σοβαρές περιπτώσεις, πραγματοποιήστε ειδικές θεραπείες με συστηματικά εντομοκτόνα, σε συνδυασμό με υγρή παραφίνη.

Καρούλιασμα των ακραίων βλαστών, παρουσία αποικίας μικρών εντόμων: μελίγκρα. Πραγματοποιήστε μία ειδική θεραπεία με συστηματικό εντομοκτόνο.

#### Συναρπαστικό φυτό, ιδιαίτερα αγαπητό για την ομορφιά των χειμερινών του ανθέων



#### Έκθεση

Αναπτύσσεται καλά στη σκιά ή στο ημίφως



#### Θερμοκρασία

Άριστο: 12-16° C. Καλή ανοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες το ξηραίνουν και προκαλούν πτώση των ανθών



#### Νερό

Ποτίζετε άφθονα την περίοδο ανθοφορίας και τη θερινή περίοδο. Ποτίζετε με φειδώ το φθινόπωρο και την άνοιξη



#### Χώμα

Καλλιέργεια στο χώμα: χώμα γενικής χρήσης με προσθήκη καστανόχλωματος ή σείας, ξηρών φύλλων και βελόνων και φλοιού πεύκου



#### Λίπασμα

Μόνο κατά την ανθοφορία, προσθέστε υγρό λίπασμα για οξέφιλα φυτά κάθε 15 ημέρες



#### Ανθοφορία

Μάρτιος-Ιούνιος



#### Πολλαπλασιασμός

Με ημιζυλώδη μοσχεύματα, τα οποία λαμβάνονται στο τέλος του καλοκαιριού

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



**Θάμνοι ανθοφόροι**
**09**
**ΚΑΜΕΛΙΑ**
**Βοτανική ονομασία**

Camellia spp.

**Προέλευση** Κίνα, Ιαπωνία,  
Κορέα, Βιρμανία

**Δυσκολία καλλιέργειας**  
Μέτρια

Περιλαμβάνει 80 είδη αειθαλών θάμνων με εντυπωσιακά λαμπερά δερματώδη φύλλα και με χρώμα έντονο και σκούρο πράσινο. Κατά τους κρύους μήνες του έτους παράγει πολλά άνθη αρκετά μεγάλου μεγέθους και χρώματος ροζ, λευκού και κόκκινου. Συχνά, στα πέταλα εμφανίζονται στίγματα και ρίγες με χρωματική αντίθεση. Οι κάλυκες είναι απλοί (με 5 πέταλα) ή υπέρδιπλοι (με πολύ μεγάλο αριθμό ανθών). Τα μπουμπούκια ανθίζουν μόνο μία φορά και, μετά την ανθοφορία, αρχίζει η παραγωγή νέων φύλλων, τα οποία αυξάνουν τις διαστάσεις του φυτού.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin**
**Καλλιέργεια**

Τοποθετήστε το φυτό σε βορινούς κήπους ή σε σημεία προστατευμένα από ψηλούς τοίχους ή, ακόμα, κάτω από τη σκιά κάποιου δέντρου.

Ποτίζετε τακτικά, με νερό που δεν εμφανίζει υπερβολική σκληρότητα, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα: η καμέλια, καθώς είναι αειθαλής, διατηρεί ενεργή τη βλαστική της ζωή και το χειμώνα. Την περίοδο ανθοφορίας έχει ανάγκη από μεγαλύτερη ποσότητα νερού,

αλλά είναι πολύ ευαίσθητη στη στασιμότητα νερού, η οποία προκαλεί σχεδόν πάντα το θάνατο του φυτού.

Αντέχει πολύ ικανοποιητικά το κρύο. Σε περίπτωση που ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι πολύ κρύοι, καλό είναι να καλύψετε τα φυτά που έχουν ήδη σχηματίσει μπουμπούκια με κατάλληλα καλύμματα κατά του παγετού, για να μην καταστραφούν τα άνθη.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Πτώση των ανθέων: έλλειψη νερού, νερό με αυξημένη σκληρότητα, υπερβολικός άνεμος ή κρύο. Κιτρινωμένα φύλλα με νηματοειδή υπολείμματα στην κάτω όψη: κόκκινος τετρανυχος. Παρέμβετε με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Αποϊκές μικρών πράσινων εντόμων γύρω από τα μπουμπούκια και τα φύλλα: μελιγκρα, χρησιμοποιήστε ειδικό εντομοκτόνο.

Ρωγμές στα άκρα των φύλλων: ζημιές από προνύμφες και λεπιδόπτερα, χρησιμοποιήστε ειδικά εντομοκτόνα που ελέγχουν και τυχόν προσβολές από ωπόρρυχο.

Υπαρξη μικρών ασπιδίων στα κλαδιά: ψώρα, χρησιμοποιήστε προϊόντα με βάση υγρή παραφίνη, ακόμα καλύτερα σε συνδυασμό με ειδικό εντομοκτόνο.

Λευκή σκόνη στα φύλλα: ωίδιο ή λευκή σήψη, χρησιμοποιήστε προϊόν με βάση το θειάφι ή ένα ειδικό ωιδιοκτόνο.

Μαύρη σκόνη στα φύλλα: καπνιά, μύκητες που επικάθονται σε σακχαρώδη υπολείμματα (μελάσα) που εκκρίνουν οι αφίδες και η ψώρα, αφαιρέστε με ένα νωπό πανί τη μαύρη σκόνη από τα φύλλα και χρησιμοποιήστε ειδικά εντομοκτόνα για να απομακρύνετε τη μελιγκρα και την ψώρα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικετα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Συναρπαστικό φυτό, ιδιαίτερα αγαπητό για την ομορφιά των χειμερινών του ανθέων**

**Έκθεση**

Μερικώς σκιερή, υγρή και προστατευμένη θέση από τον άνεμο. Δεν αντέχει την άμεση έκθεση στον ήλιο


**Λίπασμα**

Δεν δέχεται πολύ λίπασμα. Προσθέστε ειδικό λίπασμα μόνο κατά την ανθοφορία


**Θερμοκρασία**

Αντέχει πολύ καλά στο κρύο. Υποφέρει στα ζεστά και ξηρά κλίματα


**Ανθοφορία**

Εναλλάσσει έτη με έντονη ανθοφορία με έτη με λίγα άνθη


**Νερό**

Διατηρείτε πάντοτε υγρό το χώμα αλλά με καλή αποστράγγιση. Δεν αντέχει τη στασιμότητα νερού


**Πολλαπλασιασμός**

Με ημιξυλώδες μίσχευμα τον Ιούλιο και με καταβολάδες


**Χώμα**

Χρησιμοποιήστε χώμα για οξύφιλα φυτά ή χώμα γενικής χρήσης αναμιγμένο με χώμα για θαμνότοποις

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



**Θάμνοι ανθοφόροι**
**10**
**Α Ζ Α Λ Ε Α**
**Βοτανική ονομασία**

Azalea indica

**Προέλευση**

Κεντρική Κίνα

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Αειθαλής θάμνος με μικρά λοχκοειδή, οβάλ φύλλα, με λαμπερό σκούρο πράσινο χρώμα στην άνω όψη και πιο ανοικτό πράσινο στην κάτω όψη. Τα άνθη είναι με απλό ή διπλό κάλυκα, είναι ρυτιδωμένα και ενωμένα σε ομάδες των 2-5.

Τα χρώματά τους είναι ζωηρά και απαλά: λευκό, ροζ ή κόκκινο και ανθίζουν, αφού υποβληθούν σε διαδικασία ενδυνάμωσης, από το Δεκέμβριο ως τον Απρίλιο και, σε περίπτωση αυθόρμητης ανθοφορίας, το Μάιο.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin**
**Καλλιέργεια**

Ποτίζετε το φυτό με μαλακό νερό και μην αφήνετε ποτέ το χώμα του να ξεραθεί. Φροντίστε να έχει χαμηλές και σταθερές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία.

Αποφύγετε τα ρεύματα αέρα, κυρίως όταν το φυτό είναι βρεγμένο. Κατά τη θερμή εποχή, βγάλτε το φυτό σε εξωτερικό χώρο, ο οποίος να είναι δροσερός και σκιερός.

Αν είναι δυνατό, σκάψτε ένα λάκκο στο χώμα και βάλτε μέσα το φυτό με τη γλάστρα και καλύψτε το με χώμα.

Το φθινόπωρο και το χειμώνα, μεταφέρετέ το σε εσωτερικό χώρο και τοποθετήστε το σε φωτεινή θέση. Ποτίζετε μέτρια χωρίς να αφήνετε το χώμα να ξεραθεί.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Τα φύλλα και τα άνθη ξεραίνονται και πέφτουν: πολύ υψηλή θερμοκρασία, σχεδόν καθόλου υγρασία στον αέρα ή έλλειψη νερού. Δημιουργήστε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιέργειας, προσπατήστε το φυτό από την άμεση ακτινοβολία, ποτίζετε το όταν είναι απαραίτητο.

Μπουμπούκια που δεν ανθίζουν: πλεόνασμα νερού. Αφήστε το χώμα να στραγγίσει τελείως πριν αρχίσετε ξανά να το ποτίζετε, με φειδώ.

Φύλλα με ημικυκλικές βλάβες στην περιφέρεια: ύπαρξη ωπίορρυγχου. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Παρουσία κίτρινων φλυκταινών σε φύλλα και υποκοτύλια: σκωρίαση (μυκητολογική ασθένεια). Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μυκητοκτόνα προϊόντα.

Αποχρωματισμένα φύλλα και νηματοειδή υπολείμματα στην κάτω όψη: κόκκινος τετράνυχος. Ψεκάστε το φυτό με νερό και σε περίπτωση βαριάς προσβολής, αντιμετωπίστε με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να καλύψετε καλά όλο το φύλλωμα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Με τον ερχομό της άνοιξης σας χαρίζει μεγαλοπρεπή και ανθεκτικά άνθη**

**Έκθεση**

Αναπτύσσεται καλά στη σκιά ή στο ημίφως. Εντός του διαμερίσματος, τοποθετήστε το φυτό σε φωτεινό χώρο


**Λίπασμα**

Στην ανθοφορία και το καλοκαίρι προσθέτετε ένα υγρό λίπασμα κάθε 15 ημέρες


**Θερμοκρασία**

Ιδανικά: 15-18°C. Οι αυξημένες θερμοκρασίες ξηραίνουν το φυτό και προκαλούν πτώση των ανθών


**Ανθοφορία**

Από το Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο, ανάλογα με τις κλιματικές περιοχές


**Νερό**

Ποτίζετε γενναιόδωρα κατά την ανθοφορία, κάθε 2 ημέρες. Μετά την ανθοφορία, μειώστε το πότισμα


**Πολλαπλασιασμός**

Με ημιζυλώδη μοσχεύματα, τα οποία λαμβάνονται στο τέλος του καλοκαιριού


**Χώμα**

Ειδικό χώμα μεταφύτευσης ή όξινο χώμα

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



**Θάμνοι ανθοφόροι**
**11**
**ΟΡΤΑΝΣΙΑ**
**Βοτανική ονομασία**

Hydrangea macrophylla

**Προέλευση** Ιαπωνία, Κίνα,  
περιοχές Ιμαλαΐων, Αμερική

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Χαμηλή

Στρογγυλόμορφος και άγριος θάμνος που φτάνει σε ύψος και διάμετρο ακόμα και τα 4m. Τα φύλλα είναι οβάλ, οδοντωτά και με χρώμα ανοικτό πράσινο. Το φθινόπωρο το φύλλωμα πέφτει και τότε λαμβάνει κοκκινωπές και χάλκινες αποχρώσεις. Οι κλασικές αποχρώσεις των ανθών είναι το κόκκινο, το μοβ, το γαλάζιο και το βιολετί. Τα χρώματα καθορίζονται εν μέρει από τη γενεπική κληρονομιά του φυτού και εν μέρει από τον τύπο εδάφους όπου αναπτύσσονται. Στα όξινα εδάφη λαμβάνουν γαλάζιο-βιολετί χρωματισμό, ενώ στα αλκαλικά εδάφη γίνονται ροζ ή λιλά.

**Οι συμβουλές Leroy Merlin**
**Καλλιέργεια**

Μπορείτε να καλλιεργήσετε την ορτανσία σε γλάστρες σε μπαλκόνια και βεράντες, αλλά και σε γλάστρες στον κήπο. Αφού παραμείνουν στη γλάστρα για μερικά χρόνια, τα φυτά μεταφυτεύονται στο χώμα (τέλη Αυγούστου).

Μερικές φορές, μετά από τη μεταφύτευση, το χρώμα των ανθών αλλάζει απόχρωση, ανάλογα με το pH του εδάφους. Προσθέστε στο χώμα όξινη τύρφη ή θειούχα για να λάβετε γαλαζωπά άνθη.

Από τον Απρίλιο ως το Σεπτέμβριο, το φυτό πρέπει να ποτίζεται γενναιόδωρα. Αν είναι δυνατό, αποφύγετε το σκληρό νερό της βρύσης και χρησιμοποιήστε βρόχινο νερό.

Τα πρώτα τρία χρόνια, οι ορτανσίες δεν κλαδεύονται, αρκεί να αφαιρείτε τα ξερά κλαδιά και τα άνθη στο τέλος του χειμώνα. Στη συνέχεια, κλαδέψτε την κόβοντας στη βάση τα κλαδιά 2-3 ετών, για να ευνοήσετε την εμφάνιση νέων βλαστών.

**Ασθένειες και συμπτώματα**

Άκρες των φύλλων που σκουραίνουν και κατιάζουν: έλλειψη νερού, ποτίζετε πιο τακτικά.

Φύλλα που αδυνατίζουν, ύπαρξη αποικιών μικρών εντόμων στα άκρα των βλαστών: μελίγκρα. Αντιμετωπίστε με ειδικό εντομοκτόνο, καλύτερα να είναι συστηματικό.

Γκρίζα φύλλα και νηματοειδή υπολείμματα στην κάτω όψη: κόκκινος τετράνυχος. Αφαιρέστε τα προσβεβλημένα φύλλα, ψεκάστε το φυτό με νερό και σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης, αντιμετωπίστε με ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να καλύψετε καλά όλο το φύλλωμα.

Φύλλα με στρώση λευκής σκόνης: ωίδιο ή λευκή σήψη. Ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το χαλκό ή με ένα ειδικό ωιδιοκτόνο.

Φύλλα με καφετί στίγματα και υγρά: βοτρυτής ή γκρι μούχλα. Αφαιρέστε τα προσβεβλημένα φύλλα, αποστραγγίστε καλά το χώμα, σταματήστε την προσθήκη λιπάσματος, κυρίως αν είναι αζωτούχο και, σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, ψεκάστε το φυτό με ειδικό μυκητοκτόνο κατά της κατωφερούς ζύμωσης.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

**Χαρίστε μεγάλα σύννεφα χρώματος από τα μέσα του καλοκαιριού μέχρι τα πρώτα κρύα**

**Έκθεση**

Τόσο σε γλάστρα όσο και στο χώμα, η ορτανσία αγαπά θέσεις με σκιά ή με μερική σκιά


**Λίπασμα**

Το καλοκαίρι και την άνοιξη, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με ειδικά προϊόντα


**Θερμοκρασία**

Ιδανικά 21°C, πάνω από αυτή τη θερμοκρασία σταματά η ανθοφορία


**Ανθοφορία**

Για φυτά σε γλάστρες: τον Απρίλιο για 6-8 εβδομάδες. Στο χώμα: από τον Ιούλιο μέχρι τα πρώτα κρύα


**Νερό**

Γενναιόδωρο και συχνό πότισμα την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αφήνετε να στραγγίζει το χώμα ανάμεσα στα ποτίσματα


**Πολλαπλασιασμός**

Με μόσχευμα που λαμβάνεται από μη ανθοφόρα κλαδιά τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο


**Χώμα**

Προσιμά χώμα γόνιμο και με καλή αποστράγγιση

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)


Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC



# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



Θάμνοι ανθοφόροι

12

Φ Ο Υ Ξ Ι Α

## Βοτανική ονομασία

Fuchsia spp.

**Προέλευση** Κεντρική και  
Νότια Αμερική, Νέα Ζηλανδία

**Δυσκολία καλλιέργειας**  
Μέτρια

Γένος που περιλαμβάνει πάνω από 100 είδη φυλλοβόλων δέντρων και θάμνων με αντίθετα, λοχοειδή φύλλα με έντονα νεύρα, ενιαία ή οδοντωπή περιμετρο και λαμπερό πράσινο χρώμα. Τα άνθη είναι κρεμαστά, αποτελούνται από έναν σωληνοειδή κάλυκα, ο οποίος καταλήγει σε τέσσερις λοβούς, και από μία στεφάνη με 4 αλληλεπικαλυπτόμενα πέταλα, με διαφορετικό χρώμα από τον κάλυκα. Από τον τελευταίο, προβάλλουν μακριοί στήμονες. Τα χρώματα των ανθών διαφέρουν, ανάλογα με το είδος και την ποικιλία: κόκκινο, ερυθρό, πορτοκαλί, ροζ, μοβ, κρεμ.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Στην αρχή της άνοιξης, μεταφυτέψτε ανάλογα με την περίπτωση τα φυτά και κόψτε τα κλαδιά τους, για να περιορίσετε τις διαστάσεις τους.

Όταν σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, φυτέψτε τα φυτά σε εξωτερικό χώρο, στο χώμα ή σε γλάστρα, επιλέγοντας μία προστατευμένη θέση, αλλά με ήλιο ή μερική σκιά.

Ποτίζετε με φειδώ, διατηρώντας ελαφρά υγρό το χώμα και προσθέτετε λίπασμα. Το καλοκαίρι, αυξήστε το πότισμα.

Με την έλευση του χειμώνα, προστατεύστε τα φυτά από το κρύο και ποτίζετέ τα ελάχιστα.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Τα φύλλα και οι μίσχοι καλύπτονται από μία λευκή μούχλα: ωίδιο ή λευκή σήψη (μυκητολογική ασθένεια). Μόλις εμφανιστούν τα πρώιμα συμπτώματα, ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση το θειάφι ή με ένα ειδικό ωιδιοκτόνο.

Φύλλα και μίσχοι με παρουσία καφετί φυλκταιών, σκωρίαση (μυκητολογική ασθένεια). Αντιμετωπίστε την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων με ειδικά μυκητοκτόνα.

Παραμορφωμένα και άτονα φύλλα, καχεκτικό φυτό, παρουσία αποικίας μικρών εντόμων σε φύλλα και υποκοτύλια: μελίγκρα. Ψεκάστε το φυτό με ειδικά εντομοκτόνα.

Αποχρωματισμένα φύλλα και παρουσία νηματωειδών υπολειμμάτων στην κάτω όψη: κόκκινος τετράνυχος. Ψεκάστε τα φύλλα με νερό και χρησιμοποιήστε ειδικό ακαρεοκτόνο, προσέχοντας να βρέξετε καλά όλο το φύλλωμα.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Μπορείτε να τις καλλιεργήσετε σε παρυφές, σε παρτέρια ή ως φυτό για μπαλκόνια ή βεράντες



**Έκθεση**  
Στον ήλιο ή στο ημίφως



**Θερμοκρασία**  
Άριστο: γύρω στους 18° C.  
Πολύ επικίνδυνες οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα



**Νερό**  
Συνεχές πότισμα την περίοδο βλάστησης. Μετά την άνθιση, μειώστε το πότισμα, μετά την πώση των φύλλων, σταματήστε εντελώς



**Λίπασμα**  
Κάθε 15-20 ημέρες, από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο, προσθέστε υγρό λίπασμα στα ανθισμένα φυτά



**Ανθοφορία**  
Για φυτά σε γλάστρες: τον Απρίλιο για 6-8 εβδομάδες.  
Στο χώμα: από τον Ιούλιο μέχρι τα πρώτα κρύα



**Πολλαπλασιασμός**  
Το Μάρτιο ή τον Απρίλιο με μοσχεύματα μίσχων, τα οποία λαμβάνονται από νεαρά βλαστάρια που δεν έχουν ανθίσει ακόμη. Επίσης, με σπόρο

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC





# Έντυπα καλλιέργειας Leroy Merlin



© Copyright 2012 - SBB AE - Λεωφ. Ηρακλείου 453 & Κόρινθου 17, 14722 Ν. Ηράκλειο

Θάμνοι ανθοφόροι

16

ΚΑΛΛΑ

## Βοτανική ονομασία

Zantedeschia aethiopyca,  
Zantedeschia rehmannii

**Προέλευση** Νότιος Αφρική

**Δυσκολία καλλιέργειας**

Αυξημένη

Γένος 8-9 ποωδών, πολυετών θαμνωδών φυτών. Χαρακτηρίζονται από την απουσία μίσχου, μεγάλα λοχαιοειδή φύλλα και μεγάλα κομψά άνθη. Η Zantedeschia aethiopyca έχει σκούρα πράσινα φύλλα, που συγκροτούνται από μακριά, ευθεία και ισχυρά στελέχη. Τα άνθη εμφανίζονται στα τέλη χειμώνα – αρχές άνοιξης, είναι κίτρινα και περιβάλλονται από λευκά σέπαλα. Η Zantedeschia rehmannii έχει πράσινα φύλλα, διάσπικτα με λευκό. Τα άνθη και τα φύλλα είναι μικρότερα από του προηγούμενου είδους και τα σέπαλα έχουν χρώμα απαλό ροζ έως κόκκινο.

## Οι συμβουλές Leroy Merlin

### Καλλιέργεια

Διατηρείτε το χώμα πάντοτε υγρό, εκτός από τους δύο μήνες μετά την ανθοφορία, οπότε πρέπει να ευνοήσετε την ανάπαυση του φυτού, παρέχοντάς του ελάχιστο νερό και σταματώντας τη χορήγηση λιπάσματος.

Με την εμφάνιση του ανθοφόρου μίσχου (τέλη χειμώνα-αρχές άνοιξης) φροντίστε να έχει θερμοκρασία τουλάχιστον 10°C.

Το καλοκαίρι, ποτίζετε ιδίως όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί εντελώς.

Το φθινόπωρο εξασφαλίστε θερμοκρασία τουλάχιστον 10-13°C. Μετά την ανθοφορία, μειώστε τις ποσότητες νερού, διατηρώντας, ωστόσο, υγρό το χώμα.

### Ασθένειες και συμπτώματα

Καχεκτικό φυτό: πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Μεταφέρετε το φυτό σε πιο κατάλληλο χώρο.

Αποχρωματισμένα φύλλα: έλλειψη νερού. Χορηγήστε περισσότερο νερό.

Φύλλα που παρουσιάζουν λευκές κηλίδες στην επάνω όψη: ωίδιο ή λευκή σήψη. Ακολουθήστε αγωγή με μυκητοκτόνο με βάση τη θειάφι ή με ένα ειδικό ωιδιοκτόνο.

Παρουσία αποικιών μικρών εντόμων στους κορυφαίους μίσχους και στα φύλλα: μελίγκρα. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό εντομοκτόνο.

Καφετίχρώμα στο τμήμα της βάσης του φυτού, το οποίο συνοδεύεται από απώλεια ζωντάνιας και κιτρινίσμα των φύλλων: σήψη της βάσης

και των ριζών. Εφαρμόστε θεραπεία στο χώμα με ένα ειδικό μυκητοκτόνο, αποστραγγίστε καλά το χώμα και εξαλείψτε τα άρρωστα φυτά.

Φύλλα με νηματοειδή υπολείμματα στην κάτω όψη: κόκκινος τετράνυχος. Ψεκάστε το φυτό με νερό και παρέμβετε με ειδικό ακαρεοκτόνο.

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων, προϊόντων για καλλωπιστικά φυτά (PPO) ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες, πρέπει πάντοτε να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα για τις συνθήκες, το χρόνο και τη δοσολογία χρήσης του προϊόντος.

### Φυτό το οποίο χαρακτηρίζεται από όμορφα κωνικά άνθη και υπέροχα χρώματα



#### Έκθεση

Φωτεινό σημείο, αλλά όχι άμεση έκθεση στο ηλιακό φως



#### Θερμοκρασία

Μέτρια και όχι υψηλή. Στα εύκρατα κλίματα, προσαρμόζεται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων



#### Νερό

Ποτίζετε άφθονα ως το τέλος της ανθοφορίας. Σταματήστε το πότισμα κατά την περίοδο ανάπαυσης. Το νερό να μην είναι παγωμένο



#### Λίπασμα

Προσθέτετε λίπασμα κάθε 15 ημέρες κατά την ανάπτυξη της βλάστησης και 1 φορά το μήνα κατά την ανθοφορία



#### Ανθοφορία

Τέλη χειμώνα – αρχές άνοιξης



#### Πολλαπλασιασμός

Με σπόρο ή με διαίρεση των ριζωμάτων (υπόγειο μίσχου)

[www.leroymerlin.gr](http://www.leroymerlin.gr)



Το έντυπο αυτό τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί με πιστοποίηση FSC

